

表 2651 体重減少量(kg) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	1 (5.3)	4 (21.1)	7 (36.8)	2 (10.5)	2 (10.5)	3 (15.8)					19 (100.0)		19	1.92	1.46
0.4～ (%)		1 (5.3)	14 (73.7)	3 (15.8)	1 (5.3)						19 (100.0)		19	1.56	0.64
0.6～ (%)	2 (2.4)	13 (15.5)	31 (36.9)	27 (32.1)	6 (7.1)	4 (4.8)	1 (1.2)				84 (100.0)		84	1.85	1.12
0.8～ (%)	9 (1.5)	56 (9.1)	173 (28.0)	176 (28.5)	129 (20.9)	47 (7.6)	22 (3.6)	4 (0.6)	1 (0.2)	1 (0.2)	618 (100.0)		618	2.47	1.33
1.0～ (%)	25 (0.9)	168 (5.8)	579 (19.9)	995 (34.1)	771 (26.4)	298 (10.2)	71 (2.4)	5 (0.2)	2 (0.1)	2 (0.1)	2,916 (100.0)		2,916	2.67	1.17
1.2～ (%)	18 (0.2)	280 (3.7)	1,397 (18.6)	2,948 (39.3)	2,158 (28.8)	584 (7.8)	101 (1.3)	16 (0.2)	3 (0.0)	1 (0.0)	7,506 (100.0)		7,506	2.68	1.00
1.4～ (%)	19 (0.2)	319 (3.6)	1,775 (19.8)	3,926 (43.8)	2,205 (24.6)	615 (6.9)	95 (1.1)	15 (0.2)	3 (0.0)		8,972 (100.0)		8,972	2.60	0.96
1.6～ (%)	12 (0.2)	211 (3.2)	1,476 (22.1)	3,147 (47.2)	1,418 (21.2)	346 (5.2)	53 (0.8)	7 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)	6,673 (100.0)		6,673	2.51	0.90
1.8～ (%)	3 (0.1)	105 (3.0)	921 (26.0)	1,688 (47.7)	649 (18.3)	148 (4.2)	19 (0.5)	4 (0.1)		3 (0.1)	3,540 (100.0)		3,540	2.43	0.88
2.0～ (%)	3 (0.1)	76 (3.0)	694 (27.0)	1,228 (47.8)	427 (16.6)	91 (3.5)	22 (0.9)	4 (0.2)	4 (0.2)	19 (0.7)	2,568 (100.0)		2,568	2.49	1.37
合計 (%)	92 (0.3)	1,233 (3.7)	7,067 (21.5)	14,140 (43.0)	7,766 (23.6)	2,136 (6.5)	384 (1.2)	55 (0.2)	15 (0.0)	27 (0.1)	32,915 (100.0)		32,915	2.57	1.02
記載なし (%)	5 (0.4)	87 (6.9)	333 (26.3)	514 (40.6)	248 (19.6)	55 (4.3)	16 (1.3)	4 (0.3)	1 (0.1)	3 (0.2)	1,266 (100.0)	790	2,056	2.41	1.21
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	1.32	1.46	1.57	1.57	1.50	1.46	1.43	1.47	1.68	2.11	1.54		1.54		
標準偏差	0.33	0.33	0.33	0.31	0.28	0.28	0.32	0.33	0.61	0.49	0.31		0.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査