

表 2652 体重減少量(kg) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別(血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	1 (11.1)		3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)	3 (33.3)					9 (100.0)		9	2.53	1.73
0.4～ (%)		1 (7.7)	10 (76.9)	2 (15.4)							13 (100.0)		13	1.41	0.60
0.6～ (%)	2 (3.1)	8 (12.3)	23 (35.4)	21 (32.3)	6 (9.2)	4 (6.2)	1 (1.5)				65 (100.0)		65	1.99	1.19
0.8～ (%)	8 (1.5)	41 (7.7)	137 (25.7)	154 (28.9)	118 (22.1)	47 (8.8)	22 (4.1)	4 (0.8)	1 (0.2)	1 (0.2)	533 (100.0)		533	2.58	1.35
1.0～ (%)	19 (0.8)	119 (4.7)	461 (18.3)	835 (33.1)	728 (28.9)	283 (11.2)	67 (2.7)	5 (0.2)	2 (0.1)	2 (0.1)	2,521 (100.0)		2,521	2.76	1.16
1.2～ (%)	11 (0.2)	188 (3.1)	966 (15.7)	2,364 (38.5)	1,950 (31.7)	551 (9.0)	98 (1.6)	15 (0.2)	3 (0.0)	1 (0.0)	6,147 (100.0)		6,147	2.79	0.99
1.4～ (%)	8 (0.1)	170 (2.7)	944 (15.2)	2,628 (42.4)	1,779 (28.7)	561 (9.1)	88 (1.4)	13 (0.2)	3 (0.0)		6,194 (100.0)		6,194	2.77	0.97
1.6～ (%)	3 (0.1)	61 (1.9)	469 (14.4)	1,414 (43.5)	949 (29.2)	298 (9.2)	48 (1.5)	5 (0.2)	2 (0.1)	1 (0.0)	3,250 (100.0)		3,250	2.80	0.95
1.8～ (%)		22 (1.9)	184 (16.0)	471 (40.9)	329 (28.6)	122 (10.6)	18 (1.6)	3 (0.3)		3 (0.3)	1,152 (100.0)		1,152	2.84	1.03
2.0～ (%)	2 (0.3)	9 (1.4)	107 (16.1)	271 (40.8)	180 (27.1)	59 (8.9)	18 (2.7)	4 (0.6)	2 (0.3)	12 (1.8)	664 (100.0)		664	3.05	1.99
合計 (%)	54 (0.3)	619 (3.0)	3,304 (16.1)	8,161 (39.7)	6,040 (29.4)	1,928 (9.4)	360 (1.8)	49 (0.2)	13 (0.1)	20 (0.1)	20,548 (100.0)		20,548	2.78	1.07
記載なし (%)	4 (0.6)	42 (5.8)	137 (18.9)	289 (39.9)	183 (25.2)	50 (6.9)	15 (2.1)	3 (0.4)		2 (0.3)	725 (100.0)	503	1,228	2.64	1.32
総計 (%)	58 (0.3)	661 (3.1)	3,441 (16.2)	8,450 (39.7)	6,223 (29.3)	1,978 (9.3)	375 (1.8)	52 (0.2)	13 (0.1)	22 (0.1)	21,273 (100.0)	503	21,776	2.78	1.08
平均	1.22	1.35	1.42	1.46	1.44	1.44	1.41	1.45	1.54	1.96	1.44		1.44		
標準偏差	0.32	0.26	0.28	0.26	0.25	0.27	0.30	0.33	0.52	0.48	0.27		0.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査