

表 2655 体重減少量(kg) equilibrated Kt/V(eKt/V)別(血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	1 (11.1)		3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)	3 (33.3)					9 (100.0)		9	2.53	1.73
0.4～ (%)		3 (9.4)	17 (53.1)	10 (31.3)	1 (3.1)	1 (3.1)					32 (100.0)		32	1.75	0.88
0.6～ (%)	6 (2.2)	30 (11.0)	83 (30.4)	90 (33.0)	38 (13.9)	16 (5.9)	10 (3.7)				273 (100.0)		273	2.24	1.24
0.8～ (%)	15 (0.8)	95 (5.0)	384 (20.3)	613 (32.5)	512 (27.1)	204 (10.8)	53 (2.8)	7 (0.4)	2 (0.1)	3 (0.2)	1,888 (100.0)		1,888	2.73	1.21
1.0～ (%)	16 (0.3)	185 (3.0)	968 (15.8)	2,324 (38.0)	1,900 (31.1)	600 (9.8)	104 (1.7)	14 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	6,116 (100.0)		6,116	2.80	1.02
1.2～ (%)	10 (0.1)	205 (2.9)	1,060 (14.9)	2,961 (41.7)	2,145 (30.2)	604 (8.5)	99 (1.4)	15 (0.2)	3 (0.0)		7,102 (100.0)		7,102	2.77	0.97
1.4～ (%)	3 (0.1)	69 (2.0)	508 (14.9)	1,457 (42.7)	981 (28.8)	327 (9.6)	56 (1.6)	7 (0.2)	1 (0.0)	2 (0.1)	3,411 (100.0)		3,411	2.81	0.98
1.6～ (%)	1 (0.1)	22 (2.0)	171 (15.4)	462 (41.7)	299 (27.0)	120 (10.8)	22 (2.0)	3 (0.3)	2 (0.2)	7 (0.6)	1,109 (100.0)		1,109	2.90	1.27
1.8～ (%)		7 (1.8)	67 (17.5)	158 (41.4)	99 (25.9)	34 (8.9)	11 (2.9)	1 (0.3)		5 (1.3)	382 (100.0)		382	2.94	1.60
2.0～ (%)	2 (0.9)	3 (1.3)	44 (18.9)	88 (37.8)	64 (27.5)	20 (8.6)	6 (2.6)	2 (0.9)	1 (0.4)	3 (1.3)	233 (100.0)	2	235	3.01	2.47
合計 (%)	54 (0.3)	619 (3.0)	3,305 (16.1)	8,164 (39.7)	6,040 (29.4)	1,929 (9.4)	361 (1.8)	49 (0.2)	13 (0.1)	21 (0.1)	20,555 (100.0)	2	20,557	2.78	1.07
記載なし (%)	4 (0.6)	42 (5.8)	136 (18.9)	286 (39.8)	183 (25.5)	49 (6.8)	14 (1.9)	3 (0.4)		1 (0.1)	718 (100.0)	501	1,219	2.61	1.10
総計 (%)	58 (0.3)	661 (3.1)	3,441 (16.2)	8,450 (39.7)	6,223 (29.3)	1,978 (9.3)	375 (1.8)	52 (0.2)	13 (0.1)	22 (0.1)	21,273 (100.0)	503	21,776	2.78	1.08
平均	1.08	1.19	1.25	1.28	1.26	1.26	1.25	1.29	1.36	1.70	1.27	2.46	1.27		
標準偏差	0.31	0.24	0.27	0.24	0.23	0.25	0.29	0.30	0.48	0.44	0.25	0.33	0.25		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査