

表 2657 体重減少量(kg) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	2 (4.7)	13 (30.2)	17 (39.5)	4 (9.3)	5 (11.6)	2 (4.7)					43 (100.0)		43	1.47	1.20
0.4～ (%)	25 (2.2)	194 (17.2)	434 (38.4)	343 (30.4)	98 (8.7)	30 (2.7)	5 (0.4)				1,129 (100.0)	1	1,130	1.81	1.01
0.6～ (%)	40 (0.4)	543 (6.0)	2,567 (28.3)	3,798 (41.9)	1,702 (18.8)	358 (3.9)	52 (0.6)	7 (0.1)	3 (0.0)	2 (0.0)	9,072 (100.0)	1	9,073	2.32	0.95
0.8～ (%)	22 (0.1)	396 (2.7)	2,929 (19.7)	6,650 (44.7)	3,682 (24.7)	989 (6.6)	176 (1.2)	26 (0.2)	4 (0.0)	6 (0.0)	14,880 (100.0)		14,880	2.63	0.94
1.0～ (%)	3 (0.0)	82 (1.3)	988 (15.1)	2,821 (43.2)	1,902 (29.1)	589 (9.0)	113 (1.7)	15 (0.2)	6 (0.1)	11 (0.2)	6,530 (100.0)	1	6,531	2.84	1.04
1.2～ (%)		7 (0.6)	125 (10.7)	483 (41.4)	354 (30.3)	149 (12.8)	33 (2.8)	7 (0.6)	2 (0.2)	7 (0.6)	1,167 (100.0)		1,167	3.08	1.35
1.4～ (%)		1 (0.8)	15 (11.9)	56 (44.4)	25 (19.8)	20 (15.9)	6 (4.8)	1 (0.8)		2 (1.6)	126 (100.0)	2	128	3.18	1.62
1.6～ (%)			1 (9.1)	7 (63.6)	1 (9.1)	1 (9.1)				1 (9.1)	11 (100.0)	2	13	5.04	7.98
1.8～ (%)												1	1		
2.0～ (%)				1 (50.0)	1 (50.0)						2 (100.0)	4	6	2.55	0.78
合計 (%)	92 (0.3)	1,236 (3.8)	7,076 (21.5)	14,163 (43.0)	7,770 (23.6)	2,138 (6.5)	385 (1.2)	56 (0.2)	15 (0.0)	29 (0.1)	32,960 (100.0)	12	32,972	2.58	1.03
記載なし (%)	5 (0.4)	84 (6.9)	324 (26.5)	491 (40.2)	244 (20.0)	53 (4.3)	15 (1.2)	3 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,221 (100.0)	778	1,999	2.38	1.04
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	0.69	0.75	0.83	0.89	0.91	0.94	0.96	0.98	0.99	1.11	0.88	1.78	0.88		
標準偏差	0.15	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.19	0.18	0.23	0.17	0.80	0.17		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査