

表 2658 体重減少量(kg) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	1 (5.0)	4 (20.0)	8 (40.0)	2 (10.0)	3 (15.0)	2 (10.0)					20 (100.0)		20	1.81	1.38
0.4～ (%)	12 (1.7)	103 (14.2)	254 (34.9)	238 (32.7)	87 (12.0)	28 (3.9)	5 (0.7)				727 (100.0)	1	728	1.99	1.06
0.6～ (%)	25 (0.4)	289 (4.8)	1,418 (23.3)	2,520 (41.5)	1,435 (23.6)	332 (5.5)	50 (0.8)	5 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	6,078 (100.0)	1	6,079	2.48	0.97
0.8～ (%)	14 (0.1)	187 (2.0)	1,308 (13.8)	3,957 (41.6)	2,937 (30.9)	904 (9.5)	165 (1.7)	23 (0.2)	4 (0.0)	6 (0.1)	9,505 (100.0)		9,505	2.85	0.97
1.0～ (%)	2 (0.1)	36 (1.0)	281 (7.8)	1,287 (35.6)	1,347 (37.3)	525 (14.5)	106 (2.9)	15 (0.4)	5 (0.1)	9 (0.2)	3,613 (100.0)		3,613	3.16	1.11
1.2～ (%)		1 (0.2)	34 (6.0)	151 (26.5)	214 (37.6)	129 (22.7)	31 (5.4)	5 (0.9)	2 (0.4)	2 (0.4)	569 (100.0)		569	3.49	1.36
1.4～ (%)		1 (2.2)	2 (4.3)	11 (23.9)	17 (37.0)	9 (19.6)	4 (8.7)	1 (2.2)		1 (2.2)	46 (100.0)	2	48	3.69	1.85
1.6～ (%)				1 (33.3)		1 (33.3)				1 (33.3)	3 (100.0)	2	5	11.83	14.91
1.8～ (%)															
2.0～ (%)					1 (100.0)						1 (100.0)	2	3	3.10	
合計 (%)	54 (0.3)	621 (3.0)	3,305 (16.1)	8,167 (39.7)	6,041 (29.4)	1,930 (9.4)	361 (1.8)	49 (0.2)	13 (0.1)	21 (0.1)	20,562 (100.0)	8	20,570	2.78	1.07
記載なし (%)	4 (0.6)	40 (5.6)	136 (19.1)	283 (39.8)	182 (25.6)	48 (6.8)	14 (2.0)	3 (0.4)		1 (0.1)	711 (100.0)	495	1,206	2.61	1.10
総計 (%)	58 (0.3)	661 (3.1)	3,441 (16.2)	8,450 (39.7)	6,223 (29.3)	1,978 (9.3)	375 (1.8)	52 (0.2)	13 (0.1)	22 (0.1)	21,273 (100.0)	503	21,776	2.78	1.08
平均	0.70	0.74	0.80	0.86	0.90	0.94	0.95	0.98	1.00	1.06	0.87	1.61	0.87		
標準偏差	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.19	0.16	0.25	0.16	0.78	0.16		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査