

表 2659 体重減少量(kg) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	1 (4.3)	9 (39.1)	9 (39.1)	2 (8.7)	2 (8.7)						23 (100.0)		23	1.18	0.96
0.4～ (%)	13 (3.2)	91 (22.6)	180 (44.8)	105 (26.1)	11 (2.7)	2 (0.5)					402 (100.0)		402	1.50	0.83
0.6～ (%)	15 (0.5)	254 (8.5)	1,149 (38.4)	1,278 (42.7)	267 (8.9)	26 (0.9)	2 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.0)		2,994 (100.0)		2,994	2.00	0.79
0.8～ (%)	8 (0.1)	209 (3.9)	1,621 (30.2)	2,693 (50.1)	745 (13.9)	85 (1.6)	11 (0.2)	3 (0.1)			5,375 (100.0)		5,375	2.24	0.76
1.0～ (%)	1 (0.0)	46 (1.6)	707 (24.2)	1,534 (52.6)	555 (19.0)	64 (2.2)	7 (0.2)		1 (0.0)	2 (0.1)	2,917 (100.0)	1	2,918	2.43	0.79
1.2～ (%)		6 (1.0)	91 (15.2)	332 (55.5)	140 (23.4)	20 (3.3)	2 (0.3)	2 (0.3)		5 (0.8)	598 (100.0)		598	2.68	1.22
1.4～ (%)			13 (16.3)	45 (56.3)	8 (10.0)	11 (13.8)	2 (2.5)			1 (1.3)	80 (100.0)		80	2.88	1.39
1.6～ (%)			1 (12.5)	6 (75.0)	1 (12.5)						8 (100.0)		8	2.49	0.50
1.8～ (%)												1	1		
2.0～ (%)				1 (100.0)							1 (100.0)	2	3	2.00	
合計 (%)	38 (0.3)	615 (5.0)	3,771 (30.4)	5,996 (48.4)	1,729 (13.9)	208 (1.7)	24 (0.2)	7 (0.1)	2 (0.0)	8 (0.1)	12,398 (100.0)	4	12,402	2.23	0.84
記載なし (%)	1 (0.2)	44 (8.6)	188 (36.9)	208 (40.8)	62 (12.2)	5 (1.0)	1 (0.2)		1 (0.2)		510 (100.0)	283	793	2.07	0.85
総計 (%)	39 (0.3)	659 (5.1)	3,959 (30.7)	6,204 (48.1)	1,791 (13.9)	213 (1.7)	25 (0.2)	7 (0.1)	3 (0.0)	8 (0.1)	12,908 (100.0)	287	13,195	2.22	0.84
平均	0.67	0.76	0.86	0.92	0.96	1.00	1.02	0.96	0.89	1.25	0.90	2.11	0.90		
標準偏差	0.14	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.20	0.24	0.35	0.14	0.18	0.83	0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査