

表 2663 体重減少量(kg) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前アルブミン濃度	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)		3 (33.3)	1 (11.1)	5 (55.6)							9 (100.0)	1	10	1.76	0.76
1.5～ (%)		13 (30.2)	20 (46.5)	7 (16.3)	2 (4.7)	1 (2.3)					43 (100.0)		43	1.47	0.89
2.0～ (%)	8 (3.4)	41 (17.4)	91 (38.7)	79 (33.6)	11 (4.7)	4 (1.7)	1 (0.4)				235 (100.0)	4	239	1.69	0.97
2.5～ (%)	4 (0.3)	116 (9.8)	410 (34.7)	457 (38.7)	161 (13.6)	23 (1.9)	6 (0.5)	2 (0.2)		2 (0.2)	1,181 (100.0)	11	1,192	2.10	1.01
3.0～ (%)	17 (0.2)	305 (4.0)	1,945 (25.4)	3,416 (44.6)	1,540 (20.1)	364 (4.7)	48 (0.6)	16 (0.2)	5 (0.1)	10 (0.1)	7,666 (100.0)	48	7,714	2.46	1.01
3.5～ (%)	42 (0.2)	548 (3.0)	3,569 (19.8)	7,821 (43.5)	4,480 (24.9)	1,232 (6.9)	241 (1.3)	27 (0.2)	10 (0.1)	14 (0.1)	17,984 (100.0)	97	18,081	2.63	1.00
4.0～ (%)	18 (0.3)	240 (3.8)	1,167 (18.7)	2,529 (40.5)	1,652 (26.4)	528 (8.5)	96 (1.5)	13 (0.2)	1 (0.0)	4 (0.1)	6,248 (100.0)	35	6,283	2.68	1.09
4.5～ (%)	7 (2.6)	21 (7.7)	51 (18.6)	107 (39.1)	69 (25.2)	15 (5.5)	4 (1.5)				274 (100.0)	1	275	2.45	1.13
5.0～ (%)			3 (20.0)	5 (33.3)	6 (40.0)	1 (6.7)					15 (100.0)		15	2.70	0.68
合計 (%)	96 (0.3)	1,287 (3.8)	7,257 (21.6)	14,426 (42.9)	7,921 (23.5)	2,168 (6.4)	396 (1.2)	58 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	33,655 (100.0)	197	33,852	2.57	1.03
記載なし (%)	1 (0.2)	33 (6.3)	143 (27.2)	228 (43.3)	93 (17.7)	23 (4.4)	4 (0.8)	1 (0.2)			526 (100.0)	593	1,119	2.36	0.95
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	3.61	3.53	3.57	3.64	3.69	3.73	3.76	3.67	3.64	3.52	3.64	3.56	3.64		
標準偏差	0.58	0.54	0.42	0.37	0.34	0.33	0.31	0.36	0.31	0.39	0.38	0.46	0.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査