

表 2667 体重減少量(kg) PTH値(pg/mL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	7 (0.5)	60 (4.1)	433 (29.6)	652 (44.5)	241 (16.5)	55 (3.8)	13 (0.9)	1 (0.1)		2 (0.1)	1,464 (100.0)	7	1,471	2.34	0.97
20～ (%)	3 (0.2)	107 (5.6)	476 (25.1)	832 (43.9)	375 (19.8)	86 (4.5)	15 (0.8)	1 (0.1)			1,895 (100.0)	12	1,907	2.40	0.94
40～ (%)	8 (0.4)	104 (4.9)	505 (23.8)	900 (42.3)	482 (22.7)	109 (5.1)	11 (0.5)	2 (0.1)	1 (0.0)	4 (0.2)	2,126 (100.0)	9	2,135	2.47	1.06
60～ (%)	9 (0.4)	109 (4.9)	515 (23.2)	953 (42.9)	504 (22.7)	114 (5.1)	13 (0.6)	5 (0.2)	1 (0.0)		2,223 (100.0)	7	2,230	2.47	0.95
80～ (%)	5 (0.2)	108 (4.3)	547 (21.9)	1,087 (43.6)	558 (22.4)	151 (6.1)	30 (1.2)	3 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,495 (100.0)	16	2,511	2.55	1.03
100～ (%)	4 (0.2)	106 (4.3)	550 (22.5)	1,064 (43.5)	556 (22.7)	137 (5.6)	19 (0.8)	5 (0.2)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,444 (100.0)	15	2,459	2.52	0.98
120～ (%)	8 (0.4)	90 (4.0)	490 (21.6)	995 (43.9)	522 (23.0)	135 (6.0)	22 (1.0)	3 (0.1)		3 (0.1)	2,268 (100.0)	13	2,281	2.55	1.13
140～ (%)	7 (0.3)	60 (3.0)	393 (19.4)	902 (44.6)	517 (25.5)	122 (6.0)	18 (0.9)	4 (0.2)		1 (0.0)	2,024 (100.0)	11	2,035	2.61	1.03
160～ (%)	2 (0.1)	62 (3.3)	405 (21.6)	808 (43.0)	432 (23.0)	134 (7.1)	29 (1.5)	2 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.1)	1,877 (100.0)	15	1,892	2.61	1.01
180～ (%)	12 (0.3)	141 (3.2)	836 (19.2)	1,855 (42.6)	1,118 (25.7)	314 (7.2)	58 (1.3)	14 (0.3)	2 (0.0)	8 (0.2)	4,358 (100.0)	22	4,380	2.66	1.10
240～ (%)		3 (4.3)	10 (14.3)	36 (51.4)	16 (22.9)	5 (7.1)					70 (100.0)		70	2.59	0.88
241～ (%)	7 (0.3)	57 (2.2)	470 (18.4)	1,102 (43.1)	678 (26.5)	200 (7.8)	34 (1.3)	5 (0.2)		3 (0.1)	2,556 (100.0)	19	2,575	2.70	1.00
300～ (%)		44 (3.0)	277 (18.7)	590 (39.8)	414 (28.0)	123 (8.3)	28 (1.9)	4 (0.3)	1 (0.1)		1,481 (100.0)	8	1,489	2.71	1.00
360～ (%)	4 (0.4)	25 (2.7)	171 (18.6)	375 (40.7)	243 (26.4)	90 (9.8)	10 (1.1)	2 (0.2)	1 (0.1)		921 (100.0)	4	925	2.71	1.00
420～ (%)	5 (1.0)	20 (3.8)	103 (19.8)	203 (39.0)	129 (24.8)	45 (8.6)	16 (3.1)				521 (100.0)	3	524	2.68	1.11
480～ (%)	1 (0.8)	4 (3.2)	20 (16.0)	52 (41.6)	38 (30.4)	8 (6.4)	1 (0.8)	1 (0.8)			125 (100.0)		125	2.70	1.03
500～ (%)		1 (0.5)	29 (14.4)	86 (42.6)	60 (29.7)	20 (9.9)	6 (3.0)				202 (100.0)	2	204	2.90	0.97
540～ (%)		3 (1.3)	43 (18.7)	102 (44.3)	51 (22.2)	19 (8.3)	9 (3.9)	1 (0.4)	2 (0.9)		230 (100.0)	2	232	2.83	1.11
600～ (%)	1 (0.3)	11 (2.8)	61 (15.6)	140 (35.8)	110 (28.1)	44 (11.3)	20 (5.1)	3 (0.8)	1 (0.3)		391 (100.0)		391	2.96	1.15
800～ (%)		15 (4.5)	62 (18.7)	107 (32.3)	87 (26.3)	42 (12.7)	15 (4.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	331 (100.0)	3	334	2.88	1.30
合計 (%)	83 (0.3)	1,130 (3.8)	6,396 (21.3)	12,841 (42.8)	7,131 (23.8)	1,953 (6.5)	367 (1.2)	57 (0.2)	16 (0.1)	28 (0.1)	30,002 (100.0)	168	30,170	2.58	1.04
記載なし (%)	1 (0.2)	41 (8.6)	150 (31.5)	197 (41.4)	65 (13.7)	18 (3.8)	3 (0.6)			1 (0.2)	476 (100.0)	100	576	2.23	0.96
総計 (%)	84 (0.3)	1,171 (3.8)	6,546 (21.5)	13,038 (42.8)	7,196 (23.6)	1,971 (6.5)	370 (1.2)	57 (0.2)	16 (0.1)	29 (0.1)	30,478 (100.0)	268	30,746	2.58	1.04
平均	166.04	160.44	163.81	173.46	189.43	215.81	268.50	229.84	303.88	171.86	178.78	181.09	178.80		
標準偏差	138.35	221.66	169.06	165.18	166.58	204.26	254.79	194.38	296.97	148.91	173.81	155.88	173.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査