

表 2670 体重減少量(kg) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

総コレステロール濃度	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	1 (0.1)	46 (5.4)	198 (23.3)	341 (40.2)	195 (23.0)	52 (6.1)	14 (1.6)		1 (0.1)	1 (0.1)	849 (100.0)	5	854	2.53	1.06
100～ (%)	6 (0.2)	94 (3.6)	529 (20.4)	1,092 (42.1)	665 (25.7)	171 (6.6)	28 (1.1)	5 (0.2)	2 (0.1)		2,592 (100.0)	9	2,601	2.60	0.97
120～ (%)	13 (0.3)	152 (3.1)	1,010 (20.4)	2,091 (42.2)	1,270 (25.6)	327 (6.6)	75 (1.5)	11 (0.2)	2 (0.0)	9 (0.2)	4,960 (100.0)	23	4,983	2.64	1.07
140～ (%)	15 (0.2)	213 (3.5)	1,273 (21.1)	2,565 (42.5)	1,461 (24.2)	410 (6.8)	71 (1.2)	15 (0.2)	3 (0.0)	7 (0.1)	6,033 (100.0)	25	6,058	2.61	1.07
160～ (%)	12 (0.2)	211 (4.0)	1,170 (22.2)	2,245 (42.7)	1,209 (23.0)	345 (6.6)	51 (1.0)	12 (0.2)	4 (0.1)	2 (0.0)	5,261 (100.0)	21	5,282	2.55	0.99
180～ (%)	16 (0.5)	123 (3.6)	801 (23.4)	1,505 (43.9)	715 (20.9)	224 (6.5)	37 (1.1)	3 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.1)	3,428 (100.0)	13	3,441	2.52	1.09
200～ (%)	6 (0.3)	110 (5.5)	459 (22.9)	929 (46.4)	400 (20.0)	77 (3.8)	21 (1.0)	1 (0.0)		1 (0.0)	2,004 (100.0)	3	2,007	2.44	0.96
220～ (%)	3 (0.4)	43 (5.1)	224 (26.4)	364 (42.9)	160 (18.9)	42 (5.0)	11 (1.3)	1 (0.1)			848 (100.0)	2	850	2.40	0.97
240～ (%)		24 (7.1)	95 (28.0)	143 (42.2)	60 (17.7)	14 (4.1)	3 (0.9)				339 (100.0)		339	2.32	0.98
260～ (%)		7 (3.8)	58 (31.2)	82 (44.1)	28 (15.1)	6 (3.2)	4 (2.2)			1 (0.5)	186 (100.0)		186	2.49	1.43
合計 (%)	72 (0.3)	1,023 (3.9)	5,817 (22.0)	11,357 (42.9)	6,163 (23.3)	1,668 (6.3)	315 (1.2)	48 (0.2)	13 (0.0)	24 (0.1)	26,500 (100.0)	101	26,601	2.56	1.04
記載なし (%)	25 (0.3)	297 (3.9)	1,583 (20.6)	3,297 (42.9)	1,851 (24.1)	523 (6.8)	85 (1.1)	11 (0.1)	3 (0.0)	6 (0.1)	7,681 (100.0)	689	8,370	2.58	1.00
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	162.96	162.19	160.59	158.95	155.08	155.39	156.38	150.83	144.08	154.96	158.27	151.12	158.24		
標準偏差	32.92	38.44	37.08	35.67	34.15	32.69	37.89	26.42	29.63	35.50	35.64	31.92	35.63		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査