

表 2672 体重減少量(kg) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

Non-HDL-C濃度	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)		19 (4.1)	93 (20.2)	192 (41.6)	120 (26.0)	32 (6.9)	5 (1.1)				461 (100.0)	2	463	2.62	0.98
50～ (%)	5 (0.2)	80 (3.8)	385 (18.1)	897 (42.2)	586 (27.6)	140 (6.6)	25 (1.2)	6 (0.3)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,127 (100.0)	8	2,135	2.65	0.99
70～ (%)	12 (0.3)	150 (3.3)	976 (21.6)	1,922 (42.6)	1,109 (24.6)	277 (6.1)	53 (1.2)	8 (0.2)	1 (0.0)	5 (0.1)	4,513 (100.0)	20	4,533	2.59	1.05
90～ (%)	16 (0.3)	188 (3.4)	1,226 (22.3)	2,402 (43.7)	1,230 (22.4)	351 (6.4)	63 (1.1)	9 (0.2)	2 (0.0)	7 (0.1)	5,494 (100.0)	25	5,519	2.56	1.05
110～ (%)	16 (0.4)	182 (4.0)	1,012 (22.3)	1,974 (43.4)	1,004 (22.1)	306 (6.7)	39 (0.9)	8 (0.2)	5 (0.1)	1 (0.0)	4,547 (100.0)	13	4,560	2.54	0.99
130～ (%)	7 (0.3)	130 (4.7)	605 (22.0)	1,234 (44.8)	567 (20.6)	172 (6.2)	30 (1.1)	7 (0.3)	1 (0.0)	3 (0.1)	2,756 (100.0)	10	2,766	2.52	1.03
150～ (%)	4 (0.3)	61 (4.3)	338 (24.0)	579 (41.1)	322 (22.9)	79 (5.6)	25 (1.8)	1 (0.1)			1,409 (100.0)	4	1,413	2.52	1.00
170～ (%)	3 (0.5)	35 (5.9)	159 (26.8)	231 (38.9)	114 (19.2)	36 (6.1)	15 (2.5)	1 (0.2)			594 (100.0)	1	595	2.45	1.09
190～ (%)		9 (4.2)	48 (22.2)	89 (41.2)	51 (23.6)	16 (7.4)	2 (0.9)			1 (0.5)	216 (100.0)		216	2.64	1.39
210～ (%)		6 (5.2)	32 (27.8)	48 (41.7)	20 (17.4)	7 (6.1)	2 (1.7)				115 (100.0)		115	2.49	0.98
合計 (%)	63 (0.3)	860 (3.9)	4,874 (21.9)	9,568 (43.0)	5,123 (23.0)	1,416 (6.4)	259 (1.2)	40 (0.2)	11 (0.0)	18 (0.1)	22,232 (100.0)	83	22,315	2.56	1.03
記載なし (%)	34 (0.3)	460 (3.8)	2,526 (21.1)	5,086 (42.6)	2,891 (24.2)	775 (6.5)	141 (1.2)	19 (0.2)	5 (0.0)	12 (0.1)	11,949 (100.0)	707	12,656	2.58	1.03
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	108.22	110.72	108.84	106.97	104.51	106.71	111.22	104.88	102.36	104.00	106.99	101.13	106.97		
標準偏差	30.47	34.75	33.57	32.75	33.00	33.17	38.70	30.35	28.19	33.43	33.20	29.27	33.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査