

表 2673 体重減少量(kg) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前収縮期血圧	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)				1 (100.0)							1 (100.0)		1	2.80	
60～ (%)	5 (4.5)	12 (10.9)	34 (30.9)	36 (32.7)	16 (14.5)	6 (5.5)		1 (0.9)			110 (100.0)		110	2.10	1.21
80～ (%)	7 (1.3)	56 (10.0)	189 (33.8)	217 (38.8)	71 (12.7)	16 (2.9)	3 (0.5)	1 (0.2)			560 (100.0)	1	561	2.09	0.98
100～ (%)	16 (0.6)	142 (5.8)	721 (29.2)	1,064 (43.1)	414 (16.8)	88 (3.6)	12 (0.5)	3 (0.1)	2 (0.1)	4 (0.2)	2,466 (100.0)	8	2,474	2.31	1.12
120～ (%)	19 (0.3)	295 (4.4)	1,619 (24.3)	3,005 (45.1)	1,348 (20.2)	316 (4.7)	48 (0.7)	8 (0.1)	1 (0.0)	5 (0.1)	6,664 (100.0)	11	6,675	2.45	0.95
140～ (%)	26 (0.3)	348 (3.5)	2,127 (21.2)	4,328 (43.2)	2,437 (24.3)	622 (6.2)	107 (1.1)	8 (0.1)	6 (0.1)	8 (0.1)	10,017 (100.0)	22	10,039	2.58	1.02
160～ (%)	10 (0.1)	226 (3.1)	1,340 (18.4)	3,086 (42.4)	1,928 (26.5)	540 (7.4)	114 (1.6)	19 (0.3)	4 (0.1)	10 (0.1)	7,277 (100.0)	12	7,289	2.69	1.05
180～ (%)	6 (0.2)	60 (2.2)	470 (17.2)	1,117 (40.9)	737 (27.0)	275 (10.1)	50 (1.8)	13 (0.5)	1 (0.0)	2 (0.1)	2,731 (100.0)	4	2,735	2.79	1.04
200～ (%)		17 (2.4)	105 (14.9)	282 (40.1)	192 (27.3)	84 (11.9)	22 (3.1)	2 (0.3)			704 (100.0)	2	706	2.88	1.05
220～ (%)		5 (2.8)	31 (17.1)	53 (29.3)	55 (30.4)	25 (13.8)	11 (6.1)	1 (0.6)			181 (100.0)	1	182	3.01	1.19
合計 (%)	89 (0.3)	1,161 (3.8)	6,636 (21.6)	13,189 (42.9)	7,198 (23.4)	1,972 (6.4)	367 (1.2)	56 (0.2)	14 (0.0)	29 (0.1)	30,711 (100.0)	61	30,772	2.57	1.04
記載なし (%)	8 (0.2)	159 (4.6)	764 (22.0)	1,465 (42.2)	816 (23.5)	219 (6.3)	33 (1.0)	3 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.0)	3,470 (100.0)	729	4,199	2.53	0.98
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	133.72	142.79	146.15	150.00	154.12	158.21	162.02	162.29	152.21	149.79	150.51	148.93	150.50		
標準偏差	30.00	26.30	25.39	24.41	24.16	25.34	25.79	31.07	23.08	22.83	25.06	26.43	25.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査