

表 2674 体重減少量(kg) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前拡張 期血圧	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)	1 (16.7)					6 (100.0)		6	2.77	1.12
20～ (%)	3 (2.7)	10 (9.1)	42 (38.2)	39 (35.5)	12 (10.9)	4 (3.6)					110 (100.0)	1	111	2.01	0.97
40～ (%)	15 (0.6)	161 (6.9)	765 (32.8)	1,016 (43.6)	308 (13.2)	57 (2.4)	5 (0.2)	2 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.1)	2,332 (100.0)	4	2,336	2.18	0.99
60～ (%)	42 (0.3)	541 (4.2)	3,201 (24.6)	5,894 (45.2)	2,694 (20.7)	547 (4.2)	82 (0.6)	14 (0.1)	4 (0.0)	15 (0.1)	13,034 (100.0)	27	13,061	2.44	0.99
80～ (%)	14 (0.2)	251 (3.2)	1,543 (19.5)	3,471 (43.8)	1,990 (25.1)	546 (6.9)	89 (1.1)	7 (0.1)	5 (0.1)	5 (0.1)	7,921 (100.0)	16	7,937	2.63	0.99
90～ (%)	12 (0.3)	140 (3.0)	745 (16.0)	1,872 (40.1)	1,338 (28.7)	448 (9.6)	91 (2.0)	12 (0.3)	4 (0.1)	3 (0.1)	4,665 (100.0)	6	4,671	2.79	1.05
100～ (%)	3 (0.1)	51 (2.2)	296 (12.5)	800 (33.8)	782 (33.0)	329 (13.9)	84 (3.5)	20 (0.8)		4 (0.2)	2,369 (100.0)	5	2,374	3.04	1.15
120～ (%)		3 (2.0)	13 (8.8)	44 (29.9)	45 (30.6)	27 (18.4)	15 (10.2)				147 (100.0)	2	149	3.24	1.18
140～ (%)		1 (11.1)		2 (22.2)	1 (11.1)	3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)			9 (100.0)		9	3.68	1.79
合計 (%)	89 (0.3)	1,158 (3.8)	6,606 (21.6)	13,141 (43.0)	7,171 (23.4)	1,962 (6.4)	367 (1.2)	56 (0.2)	14 (0.0)	29 (0.1)	30,593 (100.0)	61	30,654	2.57	1.04
記載なし (%)	8 (0.2)	162 (4.5)	794 (22.1)	1,513 (42.2)	843 (23.5)	229 (6.4)	33 (0.9)	3 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.0)	3,588 (100.0)	729	4,317	2.53	0.98
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	72.02	75.00	75.54	78.31	82.33	86.34	90.72	90.98	81.29	78.17	79.20	78.64	79.20		
標準偏差	16.48	15.42	14.26	14.05	14.24	15.05	16.02	17.91	12.80	14.22	14.69	18.01	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査