

表 2676 体重減少率(%) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,352	4,168	10,631	22,121	29,857	23,122	11,340	4,085	1,196	664	109,536	2,979	112,515	4.50	1.62
(%)	(2.1)	(3.8)	(9.7)	(20.2)	(27.3)	(21.1)	(10.4)	(3.7)	(1.1)	(0.6)	(100.0)				
女性	1,344	2,441	6,290	12,463	16,558	13,167	7,087	3,023	999	541	63,913	1,781	65,694	4.58	1.70
(%)	(2.1)	(3.8)	(9.8)	(19.5)	(25.9)	(20.6)	(11.1)	(4.7)	(1.6)	(0.8)	(100.0)				
合計	3,696	6,609	16,921	34,584	46,415	36,289	18,427	7,108	2,195	1,205	173,449	4,760	178,209	4.53	1.65
(%)	(2.1)	(3.8)	(9.8)	(19.9)	(26.8)	(20.9)	(10.6)	(4.1)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	3,696	6,609	16,921	34,584	46,415	36,289	18,427	7,108	2,195	1,205	173,449	4,760	178,209	4.53	1.65
(%)	(2.1)	(3.8)	(9.8)	(19.9)	(26.8)	(20.9)	(10.6)	(4.1)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査