

表 2677 体重減少率(%) 年齢(歳)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (16.7)			2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)			6 (100.0)		6	4.97	2.14
15歳～ (%)	12 (2.8)	12 (2.8)	35 (8.2)	48 (11.3)	91 (21.4)	99 (23.3)	56 (13.2)	40 (9.4)	17 (4.0)	15 (3.5)	425 (100.0)	16	441	5.14	2.01
30歳～ (%)	130 (1.8)	150 (2.1)	463 (6.4)	1,142 (15.7)	1,788 (24.6)	1,709 (23.5)	1,067 (14.7)	517 (7.1)	201 (2.8)	112 (1.5)	7,279 (100.0)	201	7,480	5.01	1.74
45歳～ (%)	542 (1.8)	865 (2.8)	2,275 (7.4)	5,508 (18.0)	8,130 (26.5)	7,213 (23.5)	3,820 (12.5)	1,558 (5.1)	470 (1.5)	262 (0.9)	30,643 (100.0)	795	31,438	4.76	1.64
60歳～ (%)	1,604 (2.0)	2,983 (3.7)	7,977 (9.8)	16,335 (20.1)	22,031 (27.1)	17,197 (21.1)	8,628 (10.6)	3,178 (3.9)	957 (1.2)	498 (0.6)	81,388 (100.0)	2,195	83,583	4.53	1.62
75歳～ (%)	1,301 (2.6)	2,409 (4.7)	5,781 (11.4)	10,933 (21.5)	13,630 (26.9)	9,556 (18.8)	4,595 (9.1)	1,724 (3.4)	519 (1.0)	301 (0.6)	50,749 (100.0)	1,463	52,212	4.35	1.65
90歳～ (%)	107 (3.6)	189 (6.4)	389 (13.2)	618 (20.9)	741 (25.1)	513 (17.4)	260 (8.8)	90 (3.0)	31 (1.0)	17 (0.6)	2,955 (100.0)	90	3,045	4.19	1.75
合計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,920 (9.8)	34,584 (19.9)	46,413 (26.8)	36,288 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,445 (100.0)	4,760	178,205	4.53	1.65
不明 (%)			1 (25.0)		2 (50.0)	1 (25.0)					4 (100.0)		4	4.46	1.30
記載なし (%)															
総計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65
平均	69.68	70.52	69.88	68.81	67.94	66.81	66.12	65.28	64.65	64.73	67.84	68.18	67.85		
標準偏差	12.36	11.61	11.53	11.72	11.92	12.21	12.58	13.11	13.89	14.41	12.15	12.29	12.15		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査