

表 2678 体重減少率(%) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	1,659 (2.9)	2,752 (4.9)	6,466 (11.4)	12,286 (21.7)	15,267 (27.0)	10,517 (18.6)	4,953 (8.7)	1,784 (3.2)	582 (1.0)	361 (0.6)	56,627 (100.0)	1,662	58,289	4.32	1.66
5年～ (%)	1,110 (1.9)	2,031 (3.5)	5,264 (9.1)	11,090 (19.2)	15,552 (27.0)	12,589 (21.8)	6,380 (11.1)	2,477 (4.3)	727 (1.3)	421 (0.7)	57,641 (100.0)	1,586	59,227	4.60	1.64
10年～ (%)	473 (1.6)	895 (3.1)	2,440 (8.3)	5,299 (18.1)	7,745 (26.5)	6,592 (22.5)	3,679 (12.6)	1,408 (4.8)	464 (1.6)	246 (0.8)	29,241 (100.0)	791	30,032	4.72	1.64
15年～ (%)	222 (1.5)	420 (2.8)	1,264 (8.5)	2,844 (19.1)	3,907 (26.3)	3,373 (22.7)	1,803 (12.1)	736 (4.9)	207 (1.4)	95 (0.6)	14,871 (100.0)	378	15,249	4.70	1.60
20年～ (%)	112 (1.4)	239 (3.1)	702 (9.0)	1,490 (19.2)	2,046 (26.4)	1,701 (21.9)	879 (11.3)	399 (5.1)	134 (1.7)	55 (0.7)	7,757 (100.0)	174	7,931	4.68	1.65
25年～ (%)	62 (1.6)	134 (3.4)	374 (9.5)	837 (21.2)	1,025 (26.0)	866 (21.9)	409 (10.4)	173 (4.4)	51 (1.3)	15 (0.4)	3,946 (100.0)	98	4,044	4.55	1.58
30年～ (%)	40 (1.9)	79 (3.7)	230 (10.7)	442 (20.6)	576 (26.9)	435 (20.3)	225 (10.5)	91 (4.2)	18 (0.8)	9 (0.4)	2,145 (100.0)	38	2,183	4.49	1.62
35年～ (%)	13 (1.3)	49 (4.9)	148 (14.7)	243 (24.2)	244 (24.3)	176 (17.5)	84 (8.4)	35 (3.5)	10 (1.0)	3 (0.3)	1,005 (100.0)	28	1,033	4.28	1.59
40年～ (%)	5 (2.3)	10 (4.6)	33 (15.3)	53 (24.5)	53 (24.5)	40 (18.5)	15 (6.9)	5 (2.3)	2 (0.9)		216 (100.0)	5	221	4.15	1.56
合計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65
平均	7.37	7.93	8.44	8.65	8.76	9.16	9.34	9.64	9.56	8.62	8.84	8.38	8.83		
標準偏差	6.48	6.93	7.24	7.11	6.88	6.85	6.75	6.87	6.74	6.08	6.94	6.63	6.94		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査