

表 2679 体重減少率(%) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （%）	1,048 (1.8)	1,993 (3.4)	5,293 (9.1)	11,015 (19.0)	15,364 (26.5)	12,619 (21.8)	6,751 (11.7)	2,584 (4.5)	803 (1.4)	414 (0.7)	57,884 (100.0)	1,563	59,447	4.62	1.64
慢性腎盂腎炎 （%）	58 (3.3)	56 (3.1)	174 (9.8)	339 (19.1)	444 (25.0)	371 (20.9)	205 (11.5)	84 (4.7)	29 (1.6)	19 (1.1)	1,779 (100.0)	38	1,817	4.57	1.78
急速進行性糸球 体腎炎 （%）	30 (2.4)	54 (4.3)	108 (8.7)	226 (18.1)	293 (23.5)	289 (23.2)	161 (12.9)	62 (5.0)	18 (1.4)	7 (0.6)	1,248 (100.0)	33	1,281	4.64	1.69
妊娠腎/妊娠中毒 症 （%）	6 (0.6)	27 (2.8)	67 (6.9)	184 (18.9)	272 (27.9)	232 (23.8)	122 (12.5)	45 (4.6)	14 (1.4)	7 (0.7)	976 (100.0)	23	999	4.77	1.53
その他の分類不 能の腎炎 （%）	18 (2.4)	20 (2.7)	78 (10.5)	136 (18.3)	191 (25.7)	154 (20.7)	90 (12.1)	35 (4.7)	16 (2.2)	5 (0.7)	743 (100.0)	20	763	4.64	1.75
多発性嚢胞腎 （%）	133 (2.0)	291 (4.4)	759 (11.5)	1,562 (23.6)	1,913 (28.9)	1,249 (18.9)	480 (7.3)	164 (2.5)	41 (0.6)	22 (0.3)	6,614 (100.0)	170	6,784	4.27	1.49
腎硬化症 （%）	352 (2.5)	600 (4.2)	1,462 (10.2)	2,951 (20.6)	3,828 (26.8)	2,951 (20.6)	1,404 (9.8)	512 (3.6)	159 (1.1)	89 (0.6)	14,308 (100.0)	369	14,677	4.45	1.65
悪性高血圧 （%）	30 (2.1)	43 (3.0)	117 (8.3)	249 (17.6)	369 (26.1)	316 (22.3)	171 (12.1)	73 (5.2)	26 (1.8)	22 (1.6)	1,416 (100.0)	49	1,465	4.75	1.74
糖尿病性腎症 （%）	1,342 (2.1)	2,560 (3.9)	6,527 (10.0)	13,354 (20.5)	17,783 (27.3)	13,343 (20.5)	6,489 (10.0)	2,470 (3.8)	750 (1.2)	427 (0.7)	65,045 (100.0)	1,805	66,850	4.49	1.63
SLE腎炎 （%）	36 (3.0)	43 (3.6)	89 (7.5)	208 (17.5)	304 (25.5)	268 (22.5)	154 (12.9)	69 (5.8)	13 (1.1)	7 (0.6)	1,191 (100.0)	24	1,215	4.66	1.70
アミロイド腎 （%）	10 (4.5)	3 (1.3)	24 (10.8)	40 (17.9)	57 (25.6)	50 (22.4)	24 (10.8)	8 (3.6)	5 (2.2)	2 (0.9)	223 (100.0)	7	230	4.54	1.84
痛風腎 （%）	22 (3.2)	22 (3.2)	61 (8.9)	136 (19.8)	199 (29.0)	134 (19.5)	71 (10.3)	27 (3.9)	8 (1.2)	6 (0.9)	686 (100.0)	19	705	4.52	1.77
先天性代謝異常 による腎不全 （%）	3 (2.0)	9 (6.0)	21 (13.9)	23 (15.2)	24 (15.9)	42 (27.8)	10 (6.6)	13 (8.6)	4 (2.6)	2 (1.3)	151 (100.0)	3	154	4.66	1.94
腎・尿路結核 （%）	4 (3.1)	4 (3.1)	13 (10.0)	28 (21.5)	31 (23.8)	28 (21.5)	15 (11.5)	6 (4.6)	1 (0.8)		130 (100.0)	5	135	4.49	1.63
腎・尿路結石 （%）	12 (3.5)	19 (5.5)	38 (11.0)	67 (19.3)	107 (30.8)	63 (18.2)	28 (8.1)	9 (2.6)	4 (1.2)		347 (100.0)	7	354	4.24	1.59
腎・尿路腫瘍 （%）	8 (1.7)	22 (4.8)	66 (14.3)	88 (19.0)	122 (26.4)	87 (18.8)	47 (10.2)	15 (3.2)	4 (0.9)	3 (0.6)	462 (100.0)	11	473	4.40	1.63
閉塞性尿路障害 （%）	19 (4.7)	21 (5.2)	41 (10.1)	59 (14.6)	101 (25.0)	78 (19.3)	41 (10.1)	31 (7.7)	8 (2.0)	5 (1.2)	404 (100.0)	10	414	4.59	1.96
骨髄腫 （%）	5 (6.0)	5 (6.0)	9 (10.7)	14 (16.7)	22 (26.2)	16 (19.0)	10 (11.9)	3 (3.6)			84 (100.0)	4	88	4.21	1.76
腎形成不全 （%）	9 (2.6)	8 (2.3)	27 (7.7)	62 (17.7)	90 (25.6)	79 (22.5)	44 (12.5)	18 (5.1)	11 (3.1)	3 (0.9)	351 (100.0)	8	359	4.81	1.70
不明 （%）	419 (2.9)	645 (4.5)	1,453 (10.1)	2,894 (20.1)	3,623 (25.2)	2,868 (20.0)	1,525 (10.6)	629 (4.4)	192 (1.3)	127 (0.9)	14,375 (100.0)	455	14,830	4.49	1.75
再導入 （%）	14 (1.2)	28 (2.4)	93 (8.0)	211 (18.2)	277 (23.9)	257 (22.2)	183 (15.8)	65 (5.6)	19 (1.6)	10 (0.9)	1,157 (100.0)	25	1,182	4.85	1.63
その他 （%）	118 (3.0)	136 (3.5)	401 (10.3)	738 (19.0)	1,001 (25.8)	795 (20.5)	402 (10.4)	186 (4.8)	70 (1.8)	28 (0.7)	3,875 (100.0)	112	3,987	4.53	1.74
合計 （%）	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65
記載なし （%）															
総計 （%）	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査