

表 2680 体重減少率(%) 医療機関別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	20	20	45	48	51	29	14	6	1		234	6	240	3.63	1.75
(%)	(8.5)	(8.5)	(19.2)	(20.5)	(21.8)	(12.4)	(6.0)	(2.6)	(0.4)		(100.0)				
私立大学	42	59	128	200	252	194	80	31	19	7	1,012	7	1,019	4.24	1.83
(%)	(4.2)	(5.8)	(12.6)	(19.8)	(24.9)	(19.2)	(7.9)	(3.1)	(1.9)	(0.7)	(100.0)				
国立	9	15	33	62	83	69	35	17	4	3	330	1	331	4.53	1.75
(%)	(2.7)	(4.5)	(10.0)	(18.8)	(25.2)	(20.9)	(10.6)	(5.2)	(1.2)	(0.9)	(100.0)				
県市町村立	212	385	911	1,856	2,498	1,931	962	387	94	49	9,285	461	9,746	4.49	1.64
(%)	(2.3)	(4.1)	(9.8)	(20.0)	(26.9)	(20.8)	(10.4)	(4.2)	(1.0)	(0.5)	(100.0)				
社会保険	29	76	204	422	537	494	226	87	23	9	2,107	46	2,153	4.58	1.59
(%)	(1.4)	(3.6)	(9.7)	(20.0)	(25.5)	(23.4)	(10.7)	(4.1)	(1.1)	(0.4)	(100.0)				
厚生連	115	165	409	902	1,301	1,146	557	240	64	36	4,935	161	5,096	4.65	1.67
(%)	(2.3)	(3.3)	(8.3)	(18.3)	(26.4)	(23.2)	(11.3)	(4.9)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				
その他公的	134	188	484	1,055	1,473	1,048	598	239	70	41	5,330	253	5,583	4.55	1.68
(%)	(2.5)	(3.5)	(9.1)	(19.8)	(27.6)	(19.7)	(11.2)	(4.5)	(1.3)	(0.8)	(100.0)				
私立総合	89	132	325	677	956	759	379	139	41	30	3,527	86	3,613	4.54	1.67
(%)	(2.5)	(3.7)	(9.2)	(19.2)	(27.1)	(21.5)	(10.7)	(3.9)	(1.2)	(0.9)	(100.0)				
私立	1,423	2,358	5,330	9,734	12,569	9,871	5,264	2,109	690	346	49,694	1,920	51,614	4.45	1.72
(%)	(2.9)	(4.7)	(10.7)	(19.6)	(25.3)	(19.9)	(10.6)	(4.2)	(1.4)	(0.7)	(100.0)				
私立診療所	1,623	3,211	9,052	19,628	26,695	20,748	10,312	3,853	1,189	684	96,995	1,819	98,814	4.58	1.61
(%)	(1.7)	(3.3)	(9.3)	(20.2)	(27.5)	(21.4)	(10.6)	(4.0)	(1.2)	(0.7)	(100.0)				
総計	3,696	6,609	16,921	34,584	46,415	36,289	18,427	7,108	2,195	1,205	173,449	4,760	178,209	4.53	1.65
(%)	(2.1)	(3.8)	(9.8)	(19.9)	(26.8)	(20.9)	(10.6)	(4.1)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査