

表 2681 体重減少率(%) 透析後体重(kg)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					1 (50.0)					1 (50.0)	2 (100.0)	60	62	7.54	3.77
20～ (%)	37 (5.7)	25 (3.9)	59 (9.2)	83 (12.9)	115 (17.9)	102 (15.8)	95 (14.8)	64 (9.9)	36 (5.6)	28 (4.3)	644 (100.0)	12	656	5.04	2.48
30～ (%)	452 (2.9)	613 (4.0)	1,305 (8.5)	2,219 (14.5)	3,116 (20.3)	3,184 (20.8)	2,376 (15.5)	1,290 (8.4)	504 (3.3)	285 (1.9)	15,344 (100.0)	28	15,372	4.93	1.98
40～ (%)	1,113 (2.3)	1,890 (4.0)	4,281 (9.0)	8,186 (17.2)	11,592 (24.4)	10,419 (21.9)	6,118 (12.9)	2,594 (5.5)	835 (1.8)	448 (0.9)	47,476 (100.0)	57	47,533	4.69	1.76
50～ (%)	1,172 (2.1)	2,154 (3.8)	5,594 (10.0)	11,277 (20.1)	15,057 (26.9)	12,146 (21.7)	5,798 (10.3)	2,012 (3.6)	536 (1.0)	309 (0.6)	56,055 (100.0)	51	56,106	4.49	1.60
60～ (%)	638 (1.9)	1,305 (3.8)	3,611 (10.6)	7,719 (22.7)	10,173 (30.0)	6,661 (19.6)	2,734 (8.1)	801 (2.4)	204 (0.6)	102 (0.3)	33,948 (100.0)	18	33,966	4.34	1.47
70～ (%)	210 (1.6)	436 (3.3)	1,353 (10.4)	3,287 (25.2)	4,007 (30.7)	2,516 (19.3)	901 (6.9)	238 (1.8)	61 (0.5)	24 (0.2)	13,033 (100.0)	8	13,041	4.29	1.39
80～ (%)	55 (1.2)	124 (2.8)	476 (10.7)	1,147 (25.8)	1,464 (33.0)	820 (18.5)	270 (6.1)	72 (1.6)	8 (0.2)	6 (0.1)	4,442 (100.0)	9	4,451	4.28	1.31
90～ (%)	7 (0.4)	42 (2.6)	146 (9.1)	431 (26.7)	574 (35.6)	280 (17.4)	97 (6.0)	27 (1.7)	7 (0.4)	1 (0.1)	1,612 (100.0)	3	1,615	4.32	1.21
100～ (%)	8 (1.5)	12 (2.2)	51 (9.4)	135 (25.0)	197 (36.5)	101 (18.7)	25 (4.6)	8 (1.5)	2 (0.4)	1 (0.2)	540 (100.0)		540	4.30	1.28
110～ (%)		8 (3.7)	21 (9.8)	60 (27.9)	72 (33.5)	40 (18.6)	10 (4.7)	2 (0.9)	2 (0.9)		215 (100.0)		215	4.24	1.19
120～ (%)	4 (2.9)		24 (17.4)	40 (29.0)	47 (34.1)	20 (14.5)	3 (2.2)				138 (100.0)		138	3.93	1.14
合計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	246	173,695	4.53	1.65
記載なし (%)												4,514	4,514		
総計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65
平均	52.66	54.40	55.99	57.20	56.76	54.67	52.09	49.75	47.80	47.11	55.20	40.58	55.17		
標準偏差	12.05	12.00	12.75	13.08	13.00	12.32	11.67	11.18	10.91	10.68	12.75	21.43	12.78		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査