

表 2682 体重減少率(%) 透析後体重(kg)別(施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					1 (50.0)					1 (50.0)	2 (100.0)	31	33	7.54	3.77
20～ (%)	1 (5.0)		3 (15.0)	4 (20.0)	1 (5.0)		1 (5.0)	5 (25.0)	1 (5.0)	4 (20.0)	20 (100.0)	7	27	6.12	4.13
30～ (%)	99 (4.7)	116 (5.5)	218 (10.3)	322 (15.1)	401 (18.9)	384 (18.1)	294 (13.8)	175 (8.2)	68 (3.2)	49 (2.3)	2,126 (100.0)	13	2,139	4.72	2.16
40～ (%)	585 (2.9)	856 (4.3)	1,812 (9.0)	3,342 (16.7)	4,570 (22.8)	4,363 (21.7)	2,732 (13.6)	1,185 (5.9)	395 (2.0)	224 (1.1)	20,064 (100.0)	41	20,105	4.71	1.84
50～ (%)	877 (2.1)	1,560 (3.8)	3,926 (9.6)	7,808 (19.1)	10,657 (26.1)	9,044 (22.1)	4,620 (11.3)	1,646 (4.0)	459 (1.1)	261 (0.6)	40,858 (100.0)	41	40,899	4.56	1.64
60～ (%)	549 (1.9)	1,093 (3.8)	2,936 (10.2)	6,286 (21.9)	8,545 (29.7)	5,850 (20.3)	2,459 (8.6)	748 (2.6)	195 (0.7)	96 (0.3)	28,757 (100.0)	15	28,772	4.38	1.49
70～ (%)	175 (1.5)	387 (3.4)	1,136 (9.9)	2,792 (24.3)	3,542 (30.9)	2,301 (20.0)	844 (7.4)	222 (1.9)	59 (0.5)	21 (0.2)	11,479 (100.0)	5	11,484	4.33	1.40
80～ (%)	50 (1.3)	105 (2.7)	393 (10.0)	985 (25.0)	1,319 (33.4)	751 (19.0)	258 (6.5)	69 (1.7)	8 (0.2)	6 (0.2)	3,944 (100.0)	6	3,950	4.32	1.32
90～ (%)	6 (0.4)	34 (2.3)	126 (8.7)	369 (25.4)	520 (35.8)	270 (18.6)	94 (6.5)	26 (1.8)	7 (0.5)	1 (0.1)	1,453 (100.0)	2	1,455	4.38	1.21
100～ (%)	7 (1.4)	9 (1.8)	44 (8.7)	124 (24.5)	187 (37.0)	100 (19.8)	25 (4.9)	7 (1.4)	2 (0.4)	1 (0.2)	506 (100.0)		506	4.36	1.26
110～ (%)		8 (4.0)	17 (8.6)	52 (26.3)	68 (34.3)	39 (19.7)	10 (5.1)	2 (1.0)	2 (1.0)		198 (100.0)		198	4.30	1.20
120～ (%)	3 (2.3)		20 (15.5)	37 (28.7)	46 (35.7)	20 (15.5)	3 (2.3)				129 (100.0)		129	4.01	1.11
合計 (%)	2,352 (2.1)	4,168 (3.8)	10,631 (9.7)	22,121 (20.2)	29,857 (27.3)	23,122 (21.1)	11,340 (10.4)	4,085 (3.7)	1,196 (1.1)	664 (0.6)	109,536 (100.0)	161	109,697	4.50	1.62
記載なし (%)												2,818	2,818		
総計 (%)	2,352 (2.1)	4,168 (3.8)	10,631 (9.7)	22,121 (20.2)	29,857 (27.3)	23,122 (21.1)	11,340 (10.4)	4,085 (3.7)	1,196 (1.1)	664 (0.6)	109,536 (100.0)	2,979	112,515	4.50	1.62
平均	56.38	58.16	59.71	61.02	60.94	59.07	56.83	54.94	53.59	52.39	59.46	43.73	59.43		
標準偏差	11.18	11.22	11.99	12.38	12.36	11.66	10.91	10.51	10.28	9.97	12.02	20.53	12.05		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査