

表 2683 体重減少率(%) 透析後体重(kg)別(施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											624	29	29		
20～ (%)	36 (5.8)	25 (4.0)	56 (9.0)	79 (12.7)	114 (18.3)	102 (16.3)	94 (15.1)	59 (9.5)	35 (5.6)	24 (3.8)	624 (100.0)	5	629	5.01	2.40
30～ (%)	353 (2.7)	497 (3.8)	1,087 (8.2)	1,897 (14.4)	2,715 (20.5)	2,800 (21.2)	2,082 (15.8)	1,115 (8.4)	436 (3.3)	236 (1.8)	13,218 (100.0)	15	13,233	4.96	1.95
40～ (%)	528 (1.9)	1,034 (3.8)	2,469 (9.0)	4,844 (17.7)	7,022 (25.6)	6,056 (22.1)	3,386 (12.4)	1,409 (5.1)	440 (1.6)	224 (0.8)	27,412 (100.0)	16	27,428	4.68	1.70
50～ (%)	295 (1.9)	594 (3.9)	1,668 (11.0)	3,469 (22.8)	4,400 (29.0)	3,102 (20.4)	1,178 (7.8)	366 (2.4)	77 (0.5)	48 (0.3)	15,197 (100.0)	10	15,207	4.32	1.49
60～ (%)	89 (1.7)	212 (4.1)	675 (13.0)	1,433 (27.6)	1,628 (31.4)	811 (15.6)	275 (5.3)	53 (1.0)	9 (0.2)	6 (0.1)	5,191 (100.0)	3	5,194	4.09	1.34
70～ (%)	35 (2.3)	49 (3.2)	217 (14.0)	495 (31.9)	465 (29.9)	215 (13.8)	57 (3.7)	16 (1.0)	2 (0.1)	3 (0.2)	1,554 (100.0)	3	1,557	3.97	1.33
80～ (%)	5 (1.0)	19 (3.8)	83 (16.7)	162 (32.5)	145 (29.1)	69 (13.9)	12 (2.4)	3 (0.6)			498 (100.0)	3	501	3.90	1.16
90～ (%)	1 (0.6)	8 (5.0)	20 (12.6)	62 (39.0)	54 (34.0)	10 (6.3)	3 (1.9)	1 (0.6)			159 (100.0)	1	160	3.78	1.07
100～ (%)	1 (2.9)	3 (8.8)	7 (20.6)	11 (32.4)	10 (29.4)	1 (2.9)		1 (2.9)			34 (100.0)		34	3.50	1.34
110～ (%)			4 (23.5)	8 (47.1)	4 (23.5)	1 (5.9)					17 (100.0)		17	3.56	0.87
120～ (%)	1 (11.1)		4 (44.4)	3 (33.3)	1 (11.1)						9 (100.0)		9	2.85	1.13
合計 (%)	1,344 (2.1)	2,441 (3.8)	6,290 (9.8)	12,463 (19.5)	16,558 (25.9)	13,167 (20.6)	7,087 (11.1)	3,023 (4.7)	999 (1.6)	541 (0.8)	63,913 (100.0)	85	63,998	4.58	1.70
記載なし (%)												1,696	1,696		
総計 (%)	1,344 (2.1)	2,441 (3.8)	6,290 (9.8)	12,463 (19.5)	16,558 (25.9)	13,167 (20.6)	7,087 (11.1)	3,023 (4.7)	999 (1.6)	541 (0.8)	63,913 (100.0)	1,781	65,694	4.58	1.70
平均	46.15	47.97	49.72	50.42	49.22	46.96	44.49	42.74	40.87	40.63	47.89	34.61	47.87		
標準偏差	10.69	10.46	11.46	11.43	10.48	9.28	8.35	7.69	6.86	7.49	10.44	21.95	10.47		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査