

表 2695 体重減少率(%) nPCR(g/kg/day)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	83 (22.5)	62 (16.8)	62 (16.8)	63 (17.1)	55 (14.9)	26 (7.0)	14 (3.8)	2 (0.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	369 (100.0)		369	2.71	2.00
0.4～ (%)	899 (10.7)	1,116 (13.3)	1,794 (21.3)	1,970 (23.4)	1,461 (17.4)	753 (8.9)	289 (3.4)	96 (1.1)	28 (0.3)	12 (0.1)	8,418 (100.0)		8,418	3.19	1.73
0.6～ (%)	1,584 (3.1)	2,941 (5.8)	7,244 (14.2)	12,462 (24.5)	13,401 (26.3)	8,247 (16.2)	3,447 (6.8)	1,124 (2.2)	338 (0.7)	163 (0.3)	50,951 (100.0)	5	50,956	4.07	1.59
0.8～ (%)	654 (0.9)	1,644 (2.3)	5,393 (7.7)	14,044 (19.9)	20,765 (29.5)	16,212 (23.0)	7,805 (11.1)	2,780 (3.9)	784 (1.1)	405 (0.6)	70,486 (100.0)	25	70,511	4.68	1.48
1.0～ (%)	131 (0.5)	260 (0.9)	1,098 (3.9)	3,682 (13.1)	7,465 (26.5)	7,759 (27.5)	4,760 (16.9)	2,054 (7.3)	633 (2.2)	366 (1.3)	28,208 (100.0)	40	28,248	5.24	1.51
1.2～ (%)	18 (0.4)	35 (0.7)	144 (2.9)	367 (7.5)	965 (19.7)	1,359 (27.8)	1,023 (20.9)	600 (12.3)	240 (4.9)	145 (3.0)	4,896 (100.0)	20	4,916	5.77	1.68
1.4～ (%)	1 (0.2)	5 (0.9)	14 (2.6)	41 (7.6)	69 (12.9)	125 (23.3)	125 (23.3)	80 (14.9)	43 (8.0)	33 (6.2)	536 (100.0)	19	555	6.16	1.94
1.6～ (%)		2 (2.9)	3 (4.3)	5 (7.1)	6 (8.6)	15 (21.4)	21 (30.0)	11 (15.7)	3 (4.3)	4 (5.7)	70 (100.0)	9	79	5.98	1.76
1.8～ (%)				1 (11.1)	3 (33.3)	4 (44.4)	1 (11.1)				9 (100.0)	16	25	5.09	0.97
2.0～ (%)			1 (12.5)	2 (25.0)	2 (25.0)	1 (12.5)		1 (12.5)	1 (12.5)		8 (100.0)	30	38	5.01	2.02
合計 (%)	3,370 (2.1)	6,065 (3.7)	15,753 (9.6)	32,637 (19.9)	44,192 (27.0)	34,501 (21.0)	17,485 (10.7)	6,748 (4.1)	2,071 (1.3)	1,129 (0.7)	163,951 (100.0)	164	164,115	4.55	1.64
記載なし (%)	326 (3.4)	544 (5.7)	1,168 (12.3)	1,947 (20.5)	2,223 (23.4)	1,788 (18.8)	942 (9.9)	360 (3.8)	124 (1.3)	76 (0.8)	9,498 (100.0)	4,596	14,094	4.33	1.77
総計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65
平均	0.69	0.73	0.77	0.82	0.86	0.90	0.93	0.96	0.98	1.00	0.86	1.47	0.86		
標準偏差	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.20	0.20	0.17	0.54	0.18		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査