

表 2696 体重減少率(%) nPCR(g/kg/day)別(施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	52 (21.8)	39 (16.4)	32 (13.4)	45 (18.9)	40 (16.8)	17 (7.1)	9 (3.8)	2 (0.8)	1 (0.4)	1 (0.4)	238 (100.0)		238	2.85	2.00
0.4～ (%)	595 (10.9)	707 (13.0)	1,149 (21.1)	1,296 (23.8)	967 (17.7)	487 (8.9)	180 (3.3)	56 (1.0)	11 (0.2)	7 (0.1)	5,455 (100.0)		5,455	3.19	1.70
0.6～ (%)	1,027 (3.0)	1,943 (5.7)	4,774 (14.0)	8,398 (24.6)	9,203 (27.0)	5,602 (16.4)	2,215 (6.5)	697 (2.0)	185 (0.5)	85 (0.2)	34,129 (100.0)	4	34,133	4.06	1.55
0.8～ (%)	387 (0.9)	984 (2.2)	3,314 (7.4)	8,966 (19.9)	13,520 (30.1)	10,568 (23.5)	4,921 (10.9)	1,628 (3.6)	440 (1.0)	230 (0.5)	44,958 (100.0)	17	44,975	4.68	1.44
1.0～ (%)	76 (0.5)	135 (0.8)	551 (3.4)	2,021 (12.6)	4,218 (26.2)	4,552 (28.3)	2,816 (17.5)	1,142 (7.1)	353 (2.2)	210 (1.3)	16,074 (100.0)	28	16,102	5.27	1.49
1.2～ (%)	9 (0.4)	21 (0.9)	62 (2.6)	169 (7.0)	460 (19.1)	681 (28.2)	518 (21.5)	305 (12.6)	110 (4.6)	78 (3.2)	2,413 (100.0)	15	2,428	5.81	1.70
1.4～ (%)		4 (1.6)	9 (3.5)	14 (5.4)	30 (11.6)	56 (21.7)	60 (23.3)	42 (16.3)	25 (9.7)	18 (7.0)	258 (100.0)	14	272	6.32	2.00
1.6～ (%)		1 (3.3)	2 (6.7)	1 (3.3)	1 (3.3)	7 (23.3)	10 (33.3)	6 (20.0)	2 (6.7)		30 (100.0)	4	34	5.93	1.68
1.8～ (%)				1 (50.0)	1 (50.0)						2 (100.0)	12	14	3.99	0.41
2.0～ (%)			1 (25.0)	2 (50.0)					1 (25.0)		4 (100.0)	24	28	4.59	2.82
合計 (%)	2,146 (2.1)	3,834 (3.7)	9,894 (9.6)	20,913 (20.2)	28,440 (27.5)	21,970 (21.2)	10,729 (10.4)	3,878 (3.7)	1,128 (1.1)	629 (0.6)	103,561 (100.0)	118	103,679	4.52	1.61
記載なし (%)	206 (3.4)	334 (5.6)	737 (12.3)	1,208 (20.2)	1,417 (23.7)	1,152 (19.3)	611 (10.2)	207 (3.5)	68 (1.1)	35 (0.6)	5,975 (100.0)	2,861	8,836	4.31	1.73
総計 (%)	2,352 (2.1)	4,168 (3.8)	10,631 (9.7)	22,121 (20.2)	29,857 (27.3)	23,122 (21.1)	11,340 (10.4)	4,085 (3.7)	1,196 (1.1)	664 (0.6)	109,536 (100.0)	2,979	112,515	4.50	1.62
平均	0.69	0.72	0.77	0.81	0.85	0.89	0.92	0.95	0.98	0.99	0.85	1.50	0.85		
標準偏差	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.17	0.56	0.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査