

表 2703 体重減少率(%) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	11 (1.8)	26 (4.3)	50 (8.3)	111 (18.3)	143 (23.6)	131 (21.7)	72 (11.9)	37 (6.1)	15 (2.5)	9 (1.5)	605 (100.0)	3	608	4.77	1.81
7.0～ (%)	10 (1.2)	15 (1.8)	46 (5.5)	143 (17.0)	211 (25.1)	210 (25.0)	112 (13.3)	53 (6.3)	24 (2.9)	15 (1.8)	839 (100.0)	3	842	5.03	1.70
7.5～ (%)	29 (0.9)	93 (2.8)	223 (6.7)	555 (16.8)	880 (26.6)	753 (22.8)	453 (13.7)	203 (6.1)	79 (2.4)	38 (1.1)	3,306 (100.0)	39	3,345	4.91	1.63
8.0～ (%)	144 (1.3)	290 (2.6)	864 (7.9)	1,994 (18.2)	2,949 (26.9)	2,459 (22.5)	1,407 (12.9)	550 (5.0)	175 (1.6)	114 (1.0)	10,946 (100.0)	76	11,022	4.78	1.64
8.4～ (%)	42 (1.3)	91 (2.9)	279 (8.9)	529 (16.8)	867 (27.5)	720 (22.9)	406 (12.9)	144 (4.6)	40 (1.3)	30 (1.0)	3,148 (100.0)	23	3,171	4.74	1.65
8.5～ (%)	657 (1.7)	1,171 (3.0)	3,444 (8.9)	7,556 (19.6)	10,603 (27.5)	8,504 (22.0)	4,254 (11.0)	1,670 (4.3)	484 (1.3)	265 (0.7)	38,608 (100.0)	255	38,863	4.62	1.59
9.0～ (%)	1,006 (2.0)	1,890 (3.7)	4,987 (9.8)	10,445 (20.5)	13,785 (27.0)	10,653 (20.9)	5,289 (10.4)	2,004 (3.9)	622 (1.2)	325 (0.6)	51,006 (100.0)	329	51,335	4.52	1.62
9.5～ (%)	854 (2.4)	1,520 (4.3)	3,611 (10.1)	7,311 (20.5)	9,577 (26.9)	7,233 (20.3)	3,589 (10.1)	1,336 (3.7)	396 (1.1)	209 (0.6)	35,636 (100.0)	256	35,892	4.46	1.65
10.0～ (%)	123 (2.7)	196 (4.4)	518 (11.5)	958 (21.3)	1,122 (24.9)	915 (20.3)	440 (9.8)	167 (3.7)	42 (0.9)	23 (0.5)	4,504 (100.0)	32	4,536	4.39	1.67
10.1～ (%)	321 (2.8)	550 (4.7)	1,296 (11.2)	2,341 (20.2)	3,050 (26.3)	2,229 (19.2)	1,154 (10.0)	427 (3.7)	149 (1.3)	78 (0.7)	11,595 (100.0)	86	11,681	4.41	1.71
10.5～ (%)	200 (3.5)	324 (5.7)	665 (11.8)	1,102 (19.5)	1,411 (25.0)	1,080 (19.1)	546 (9.7)	216 (3.8)	60 (1.1)	44 (0.8)	5,648 (100.0)	64	5,712	4.33	1.79
11.0～ (%)	90 (4.8)	107 (5.8)	244 (13.1)	369 (19.8)	456 (24.5)	310 (16.7)	172 (9.3)	77 (4.1)	24 (1.3)	10 (0.5)	1,859 (100.0)	32	1,891	4.21	1.82
11.5～ (%)	35 (5.2)	55 (8.2)	103 (15.3)	140 (20.8)	140 (20.8)	108 (16.1)	60 (8.9)	24 (3.6)	4 (0.6)	3 (0.4)	672 (100.0)	6	678	4.02	1.85
12.0～ (%)	34 (7.7)	57 (12.9)	75 (17.0)	86 (19.5)	74 (16.8)	60 (13.6)	32 (7.3)	13 (2.9)	5 (1.1)	5 (1.1)	441 (100.0)	5	446	3.74	2.02
合計 (%)	3,556 (2.1)	6,385 (3.8)	16,405 (9.7)	33,640 (19.9)	45,268 (26.8)	35,365 (20.9)	17,986 (10.7)	6,921 (4.1)	2,119 (1.3)	1,168 (0.7)	168,813 (100.0)	1,209	170,022	4.54	1.65
記載なし (%)	140 (3.0)	224 (4.8)	516 (11.1)	944 (20.4)	1,147 (24.7)	924 (19.9)	441 (9.5)	187 (4.0)	76 (1.6)	37 (0.8)	4,636 (100.0)	3,551	8,187	4.42	1.74
総計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65
平均	9.46	9.40	9.33	9.27	9.23	9.20	9.19	9.17	9.14	9.14	9.24	9.31	9.24		
標準偏差	0.83	0.81	0.76	0.72	0.72	0.72	0.74	0.76	0.79	0.82	0.74	0.81	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査