

表 2705 体重減少率(%) PTH値(pg/mL)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	218 (2.9)	440 (5.9)	900 (12.1)	1,472 (19.8)	1,881 (25.3)	1,388 (18.7)	710 (9.6)	285 (3.8)	80 (1.1)	48 (0.6)	7,422 (100.0)	55	7,477	4.33	1.73
20～ (%)	304 (2.9)	522 (4.9)	1,148 (10.8)	2,204 (20.7)	2,761 (25.9)	2,030 (19.1)	1,065 (10.0)	427 (4.0)	128 (1.2)	61 (0.6)	10,650 (100.0)	74	10,724	4.40	1.71
40～ (%)	314 (2.8)	521 (4.6)	1,179 (10.3)	2,397 (21.0)	2,942 (25.8)	2,303 (20.2)	1,133 (9.9)	427 (3.7)	141 (1.2)	60 (0.5)	11,417 (100.0)	85	11,502	4.42	1.67
60～ (%)	290 (2.4)	475 (3.9)	1,298 (10.7)	2,486 (20.6)	3,234 (26.7)	2,394 (19.8)	1,231 (10.2)	452 (3.7)	157 (1.3)	78 (0.6)	12,095 (100.0)	95	12,190	4.47	1.67
80～ (%)	308 (2.5)	482 (3.9)	1,238 (10.0)	2,496 (20.2)	3,313 (26.9)	2,579 (20.9)	1,262 (10.2)	445 (3.6)	140 (1.1)	75 (0.6)	12,338 (100.0)	98	12,436	4.47	1.64
100～ (%)	256 (2.1)	463 (3.8)	1,167 (9.7)	2,514 (20.9)	3,236 (26.9)	2,453 (20.4)	1,298 (10.8)	439 (3.6)	143 (1.2)	80 (0.7)	12,049 (100.0)	89	12,138	4.51	1.64
120～ (%)	224 (2.0)	387 (3.4)	1,105 (9.7)	2,283 (20.0)	3,083 (27.0)	2,497 (21.8)	1,207 (10.6)	445 (3.9)	125 (1.1)	74 (0.6)	11,430 (100.0)	70	11,500	4.55	1.61
140～ (%)	188 (1.8)	365 (3.5)	987 (9.4)	2,117 (20.3)	2,867 (27.4)	2,210 (21.2)	1,118 (10.7)	397 (3.8)	136 (1.3)	62 (0.6)	10,447 (100.0)	72	10,519	4.55	1.61
160～ (%)	163 (1.7)	338 (3.6)	860 (9.0)	1,912 (20.1)	2,687 (28.3)	2,017 (21.2)	966 (10.2)	386 (4.1)	119 (1.3)	56 (0.6)	9,504 (100.0)	57	9,561	4.56	1.59
180～ (%)	345 (1.6)	694 (3.3)	1,956 (9.2)	4,120 (19.5)	5,832 (27.6)	4,563 (21.6)	2,299 (10.9)	937 (4.4)	269 (1.3)	142 (0.7)	21,157 (100.0)	147	21,304	4.60	1.61
240～ (%)	2 (0.8)	7 (2.7)	30 (11.8)	52 (20.4)	71 (27.8)	52 (20.4)	32 (12.5)	7 (2.7)	2 (0.8)		255 (100.0)	4	259	4.55	1.44
241～ (%)	201 (1.7)	337 (2.8)	1,041 (8.7)	2,339 (19.6)	3,299 (27.6)	2,639 (22.1)	1,321 (11.0)	527 (4.4)	163 (1.4)	95 (0.8)	11,962 (100.0)	80	12,042	4.64	1.60
300～ (%)	100 (1.5)	183 (2.7)	587 (8.5)	1,253 (18.2)	1,928 (28.0)	1,556 (22.6)	807 (11.7)	300 (4.4)	107 (1.6)	64 (0.9)	6,885 (100.0)	52	6,937	4.71	1.60
360～ (%)	59 (1.5)	108 (2.8)	312 (8.0)	750 (19.2)	1,054 (27.0)	882 (22.6)	445 (11.4)	193 (4.9)	59 (1.5)	44 (1.1)	3,906 (100.0)	24	3,930	4.73	1.63
420～ (%)	39 (1.7)	76 (3.3)	192 (8.2)	410 (17.6)	611 (26.2)	534 (22.9)	284 (12.2)	131 (5.6)	39 (1.7)	14 (0.6)	2,330 (100.0)	17	2,347	4.73	1.63
480～ (%)	5 (0.9)	17 (3.0)	43 (7.5)	99 (17.3)	143 (25.0)	140 (24.5)	80 (14.0)	31 (5.4)	4 (0.7)	9 (1.6)	571 (100.0)	5	576	4.84	1.58
500～ (%)	19 (2.0)	23 (2.5)	68 (7.3)	167 (18.0)	213 (23.0)	214 (23.1)	131 (14.1)	64 (6.9)	15 (1.6)	14 (1.5)	928 (100.0)	6	934	4.86	1.73
540～ (%)	10 (1.0)	31 (3.0)	82 (8.0)	181 (17.7)	261 (25.6)	240 (23.5)	125 (12.3)	61 (6.0)	16 (1.6)	13 (1.3)	1,020 (100.0)	6	1,026	4.85	1.72
600～ (%)	24 (1.4)	46 (2.7)	103 (6.1)	279 (16.5)	450 (26.6)	401 (23.7)	214 (12.7)	117 (6.9)	32 (1.9)	24 (1.4)	1,690 (100.0)	10	1,700	4.91	1.69
800～ (%)	21 (1.5)	49 (3.5)	124 (8.9)	214 (15.4)	337 (24.2)	289 (20.7)	209 (15.0)	87 (6.2)	34 (2.4)	30 (2.2)	1,394 (100.0)	11	1,405	4.91	1.86
合計 (%)	3,090 (2.1)	5,564 (3.7)	14,420 (9.6)	29,745 (19.9)	40,203 (26.9)	31,381 (21.0)	15,937 (10.7)	6,158 (4.1)	1,909 (1.3)	1,043 (0.7)	149,450 (100.0)	1,057	150,507	4.54	1.64
記載なし (%)	75 (2.9)	156 (5.9)	351 (13.4)	530 (20.2)	645 (24.5)	502 (19.1)	238 (9.1)	91 (3.5)	26 (1.0)	14 (0.5)	2,628 (100.0)	470	3,098	4.28	1.70
総計 (%)	3,165 (2.1)	5,720 (3.8)	14,771 (9.7)	30,275 (19.9)	40,848 (26.9)	31,883 (21.0)	16,175 (10.6)	6,249 (4.1)	1,935 (1.3)	1,057 (0.7)	152,078 (100.0)	1,527	153,605	4.54	1.65
平均	143.03	150.34	157.43	163.18	170.24	176.45	182.01	192.27	189.18	217.49	170.33	167.00	170.31		
標準偏差	137.50	176.81	152.44	151.46	156.99	168.06	184.15	203.70	186.70	241.30	164.98	163.59	164.97		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査