

表 2706 体重減少率(%) PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	27 (2.3)	56 (4.7)	116 (9.7)	248 (20.7)	334 (27.9)	241 (20.1)	111 (9.3)	48 (4.0)	10 (0.8)	6 (0.5)	1,197 (100.0)	2	1,199	4.42	1.60
20～ (%)	32 (2.2)	76 (5.1)	153 (10.3)	290 (19.5)	417 (28.1)	306 (20.6)	133 (9.0)	52 (3.5)	15 (1.0)	10 (0.7)	1,484 (100.0)	8	1,492	4.42	1.69
35～ (%)	31 (2.3)	53 (4.0)	144 (10.9)	271 (20.5)	346 (26.2)	287 (21.7)	119 (9.0)	45 (3.4)	13 (1.0)	13 (1.0)	1,322 (100.0)	8	1,330	4.45	1.64
50～ (%)	36 (1.8)	68 (3.5)	206 (10.5)	405 (20.6)	532 (27.1)	425 (21.6)	186 (9.5)	76 (3.9)	19 (1.0)	12 (0.6)	1,965 (100.0)	12	1,977	4.50	1.59
75～ (%)	31 (1.8)	51 (2.9)	134 (7.7)	377 (21.8)	472 (27.3)	379 (21.9)	201 (11.6)	59 (3.4)	19 (1.1)	7 (0.4)	1,730 (100.0)	6	1,736	4.59	1.53
100～ (%)	25 (1.8)	47 (3.4)	137 (9.8)	271 (19.4)	380 (27.2)	298 (21.3)	162 (11.6)	58 (4.1)	13 (0.9)	8 (0.6)	1,399 (100.0)	10	1,409	4.56	1.59
125～ (%)	10 (1.1)	33 (3.6)	69 (7.6)	200 (22.0)	267 (29.3)	175 (19.2)	102 (11.2)	39 (4.3)	11 (1.2)	5 (0.5)	911 (100.0)	4	915	4.59	1.52
150～ (%)	2 (7.1)	5 (17.9)	7 (25.0)	7 (25.0)	7 (21.4)	6 (3.6)	1 (3.6)				28 (100.0)		28	3.99	1.32
151～ (%)	10 (1.3)	18 (2.4)	73 (9.8)	148 (19.8)	184 (24.7)	171 (22.9)	90 (12.1)	34 (4.6)	13 (1.7)	5 (0.7)	746 (100.0)	1	747	4.70	1.60
180～ (%)	8 (1.5)	18 (3.4)	45 (8.5)	107 (20.3)	131 (24.8)	122 (23.1)	60 (11.4)	29 (5.5)	3 (0.6)	5 (0.9)	528 (100.0)		528	4.67	1.70
210～ (%)	3 (0.8)	11 (3.0)	25 (6.8)	71 (19.4)	93 (25.4)	66 (18.0)	65 (17.8)	27 (7.4)	3 (0.8)	2 (0.5)	366 (100.0)		366	4.87	1.59
240～ (%)	3 (0.7)	14 (3.3)	28 (6.7)	81 (19.4)	107 (25.6)	99 (23.7)	48 (11.5)	25 (6.0)	7 (1.7)	6 (1.4)	418 (100.0)	1	419	4.81	1.64
300～ (%)	2 (1.1)	7 (4.0)	35 (19.8)	55 (31.1)	37 (20.9)	24 (13.6)	12 (6.8)	5 (2.8)			177 (100.0)		177	4.96	1.42
350～ (%)	1 (1.0)	3 (2.9)	9 (8.7)	15 (14.4)	35 (33.7)	22 (21.2)	15 (14.4)	2 (1.9)	2 (1.9)		104 (100.0)	1	105	4.65	1.47
400～ (%)	2 (1.6)	2 (1.6)	11 (8.9)	18 (14.5)	31 (25.0)	29 (23.4)	19 (15.3)	6 (4.8)	5 (4.0)	1 (0.8)	124 (100.0)		124	4.94	1.76
500～ (%)	3 (2.0)	8 (5.3)	8 (5.3)	19 (12.5)	41 (27.0)	32 (21.1)	19 (12.5)	15 (9.9)	5 (3.3)	2 (1.3)	152 (100.0)		152	5.00	1.84
合計 (%)	222 (1.8)	462 (3.7)	1,170 (9.2)	2,563 (20.3)	3,432 (27.1)	2,695 (21.3)	1,355 (10.7)	527 (4.2)	143 (1.1)	82 (0.6)	12,651 (100.0)	53	12,704	4.56	1.61
記載なし (%)	8 (2.7)	15 (5.0)	45 (15.1)	56 (18.7)	73 (24.4)	67 (22.4)	26 (8.7)	5 (1.7)	3 (1.0)	1 (0.3)	299 (100.0)	13	312	4.24	1.70
総計 (%)	230 (1.8)	477 (3.7)	1,215 (9.4)	2,619 (20.2)	3,505 (27.1)	2,762 (21.3)	1,381 (10.7)	532 (4.1)	146 (1.1)	83 (0.6)	12,950 (100.0)	66	13,016	4.55	1.61
平均	90.81	95.57	95.40	100.93	105.24	106.60	118.57	131.38	145.57	113.01	106.16	81.81	106.06		
標準偏差	119.66	110.43	104.04	95.55	109.57	102.52	123.12	163.33	177.45	107.97	110.83	62.90	110.69		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査