

表 2714 体重減少率(%) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	363	655	1,889	4,306	5,990	4,587	2,265	840	259	107	21,261	515	21,776	4.58	1.57
(%)	(1.7)	(3.1)	(8.9)	(20.3)	(28.2)	(21.6)	(10.7)	(4.0)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				
女性	224	436	1,141	2,587	3,387	2,837	1,460	568	177	83	12,900	295	13,195	4.61	1.62
(%)	(1.7)	(3.4)	(8.8)	(20.1)	(26.3)	(22.0)	(11.3)	(4.4)	(1.4)	(0.6)	(100.0)				
合計	587	1,091	3,030	6,893	9,377	7,424	3,725	1,408	436	190	34,161	810	34,971	4.59	1.59
(%)	(1.7)	(3.2)	(8.9)	(20.2)	(27.4)	(21.7)	(10.9)	(4.1)	(1.3)	(0.6)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	587	1,091	3,030	6,893	9,377	7,424	3,725	1,408	436	190	34,161	810	34,971	4.59	1.59
(%)	(1.7)	(3.2)	(8.9)	(20.2)	(27.4)	(21.7)	(10.9)	(4.1)	(1.3)	(0.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査