

表 2715 体重減少率(%) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 年齢           | 1.0未満        | 1.0～           | 2.0～           | 3.0～            | 4.0～            | 5.0～            | 6.0～            | 7.0～           | 8.0～         | 9.0～         | 合計                | 記載なし  | 総計     | 平均   | 標準偏差 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------|--------|------|------|
| 15歳未満<br>(%) |              |                |                | 1<br>(100.0)    |                 |                 |                 |                |              |              | 1<br>(100.0)      |       | 1      | 3.89 |      |
| 15歳～<br>(%)  | 3<br>(2.5)   | 2<br>(1.7)     | 9<br>(7.6)     | 15<br>(12.6)    | 17<br>(14.3)    | 31<br>(26.1)    | 20<br>(16.8)    | 16<br>(13.4)   | 4<br>(3.4)   | 2<br>(1.7)   | 119<br>(100.0)    | 5     | 124    | 5.22 | 1.94 |
| 30歳～<br>(%)  | 31<br>(1.5)  | 36<br>(1.7)    | 118<br>(5.6)   | 324<br>(15.5)   | 535<br>(25.5)   | 513<br>(24.5)   | 320<br>(15.3)   | 139<br>(6.6)   | 56<br>(2.7)  | 25<br>(1.2)  | 2,097<br>(100.0)  | 39    | 2,136  | 5.05 | 1.65 |
| 45歳～<br>(%)  | 103<br>(1.3) | 203<br>(2.5)   | 616<br>(7.7)   | 1,449<br>(18.1) | 2,198<br>(27.5) | 1,880<br>(23.5) | 974<br>(12.2)   | 405<br>(5.1)   | 116<br>(1.5) | 52<br>(0.7)  | 7,996<br>(100.0)  | 186   | 8,182  | 4.75 | 1.57 |
| 60歳～<br>(%)  | 295<br>(1.8) | 556<br>(3.4)   | 1,497<br>(9.0) | 3,423<br>(20.6) | 4,653<br>(28.0) | 3,567<br>(21.5) | 1,720<br>(10.4) | 615<br>(3.7)   | 184<br>(1.1) | 81<br>(0.5)  | 16,591<br>(100.0) | 372   | 16,963 | 4.54 | 1.57 |
| 75歳～<br>(%)  | 147<br>(2.1) | 273<br>(3.9)   | 752<br>(10.6)  | 1,622<br>(22.9) | 1,902<br>(26.9) | 1,385<br>(19.6) | 671<br>(9.5)    | 227<br>(3.2)   | 74<br>(1.0)  | 30<br>(0.4)  | 7,083<br>(100.0)  | 200   | 7,283  | 4.40 | 1.58 |
| 90歳～<br>(%)  | 8<br>(2.9)   | 21<br>(7.7)    | 38<br>(13.9)   | 59<br>(21.5)    | 72<br>(26.3)    | 48<br>(17.5)    | 20<br>(7.3)     | 6<br>(2.2)     | 2<br>(0.7)   |              | 274<br>(100.0)    | 8     | 282    | 4.07 | 1.57 |
| 合計<br>(%)    | 587<br>(1.7) | 1,091<br>(3.2) | 3,030<br>(8.9) | 6,893<br>(20.2) | 9,377<br>(27.4) | 7,424<br>(21.7) | 3,725<br>(10.9) | 1,408<br>(4.1) | 436<br>(1.3) | 190<br>(0.6) | 34,161<br>(100.0) | 810   | 34,971 | 4.59 | 1.59 |
| 不明<br>(%)    |              |                |                |                 |                 |                 |                 |                |              |              |                   |       |        |      |      |
| 記載なし<br>(%)  |              |                |                |                 |                 |                 |                 |                |              |              |                   |       |        |      |      |
| 総計<br>(%)    | 587<br>(1.7) | 1,091<br>(3.2) | 3,030<br>(8.9) | 6,893<br>(20.2) | 9,377<br>(27.4) | 7,424<br>(21.7) | 3,725<br>(10.9) | 1,408<br>(4.1) | 436<br>(1.3) | 190<br>(0.6) | 34,161<br>(100.0) | 810   | 34,971 | 4.59 | 1.59 |
| 平均           | 66.64        | 67.35          | 66.66          | 66.12           | 64.82           | 63.81           | 63.02           | 61.46          | 61.31        | 61.11        | 64.74             | 65.83 | 64.76  |      |      |
| 標準偏差         | 12.18        | 11.58          | 11.73          | 11.81           | 11.74           | 12.26           | 12.62           | 13.14          | 13.92        | 13.79        | 12.16             | 12.55 | 12.17  |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査