

表 2716 体重減少率(%) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	199 (2.4)	370 (4.4)	791 (9.4)	1,897 (22.6)	2,266 (27.0)	1,689 (20.1)	739 (8.8)	300 (3.6)	94 (1.1)	43 (0.5)	8,388 (100.0)	227	8,615	4.41	1.62
5年～ (%)	161 (1.6)	279 (2.8)	886 (9.0)	1,909 (19.4)	2,745 (27.8)	2,181 (22.1)	1,107 (11.2)	395 (4.0)	131 (1.3)	66 (0.7)	9,860 (100.0)	256	10,116	4.63	1.59
10年～ (%)	98 (1.6)	141 (2.3)	484 (8.0)	1,093 (18.0)	1,634 (27.0)	1,411 (23.3)	787 (13.0)	290 (4.8)	88 (1.5)	32 (0.5)	6,058 (100.0)	136	6,194	4.74	1.57
15年～ (%)	52 (1.3)	95 (2.5)	288 (7.5)	765 (19.8)	1,032 (26.7)	890 (23.0)	475 (12.3)	191 (4.9)	54 (1.4)	20 (0.5)	3,862 (100.0)	62	3,924	4.74	1.55
20年～ (%)	29 (1.1)	72 (2.8)	223 (8.6)	486 (18.8)	750 (29.1)	576 (22.3)	290 (11.2)	100 (3.9)	37 (1.4)	16 (0.6)	2,579 (100.0)	58	2,637	4.66	1.54
25年～ (%)	22 (1.4)	63 (3.9)	136 (8.4)	341 (21.0)	453 (27.9)	349 (21.5)	170 (10.5)	66 (4.1)	19 (1.2)	6 (0.4)	1,625 (100.0)	26	1,651	4.56	1.54
30年～ (%)	12 (1.1)	43 (3.9)	126 (11.5)	239 (21.9)	299 (27.4)	211 (19.3)	103 (9.4)	44 (4.0)	10 (0.9)	4 (0.4)	1,091 (100.0)	32	1,123	4.45	1.53
35年～ (%)	8 (1.4)	25 (4.3)	76 (13.2)	143 (24.8)	161 (28.0)	95 (16.5)	43 (7.5)	20 (3.5)	2 (0.3)	3 (0.5)	576 (100.0)	11	587	4.27	1.56
40年～ (%)	6 (4.9)	3 (2.5)	20 (16.4)	20 (16.4)	37 (30.3)	22 (18.0)	11 (9.0)	2 (1.6)	1 (0.8)		122 (100.0)	2	124	4.10	1.62
合計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	9.92	10.90	11.56	11.26	11.47	11.37	11.59	11.64	11.07	10.67	11.38	10.59	11.36		
標準偏差	8.60	9.44	9.35	9.00	8.73	8.34	8.12	8.27	7.68	8.02	8.68	8.53	8.68		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査