

表 2718 体重減少率(%) 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	1	3	6	7	11	6	3				37		37	3.92	1.66
(%)	(2.7)	(8.1)	(16.2)	(18.9)	(29.7)	(16.2)	(8.1)				(100.0)				
私立大学	3	4	17	30	36	28	21	10			149	2	151	4.55	1.65
(%)	(2.0)	(2.7)	(11.4)	(20.1)	(24.2)	(18.8)	(14.1)	(6.7)			(100.0)				
国立	1	2	5	9	4	5	3	2		1	32		32	4.43	2.33
(%)	(3.1)	(6.3)	(15.6)	(28.1)	(12.5)	(15.6)	(9.4)	(6.3)		(3.1)	(100.0)				
県市町村立	28	49	138	290	438	314	174	47	17	11	1,506	33	1,539	4.57	1.57
(%)	(1.9)	(3.3)	(9.2)	(19.3)	(29.1)	(20.8)	(11.6)	(3.1)	(1.1)	(0.7)	(100.0)				
社会保険	7	9	31	32	78	78	33	9	5		282	9	291	4.64	1.58
(%)	(2.5)	(3.2)	(11.0)	(11.3)	(27.7)	(27.7)	(11.7)	(3.2)	(1.8)		(100.0)				
厚生連	10	18	61	167	223	193	116	51	13	12	864	41	905	4.85	1.61
(%)	(1.2)	(2.1)	(7.1)	(19.3)	(25.8)	(22.3)	(13.4)	(5.9)	(1.5)	(1.4)	(100.0)				
その他公的	11	23	43	123	154	136	59	30	5	6	590	28	618	4.62	1.64
(%)	(1.9)	(3.9)	(7.3)	(20.8)	(26.1)	(23.1)	(10.0)	(5.1)	(0.8)	(1.0)	(100.0)				
私立総合	17	25	76	212	258	199	94	40	7	9	937	18	955	4.58	1.60
(%)	(1.8)	(2.7)	(8.1)	(22.6)	(27.5)	(21.2)	(10.0)	(4.3)	(0.7)	(1.0)	(100.0)				
私立	140	284	786	1,645	2,275	1,807	991	414	106	46	8,494	332	8,826	4.62	1.61
(%)	(1.6)	(3.3)	(9.3)	(19.4)	(26.8)	(21.3)	(11.7)	(4.9)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				
私立診療所	369	674	1,867	4,378	5,900	4,658	2,231	805	283	105	21,270	347	21,617	4.57	1.57
(%)	(1.7)	(3.2)	(8.8)	(20.6)	(27.7)	(21.9)	(10.5)	(3.8)	(1.3)	(0.5)	(100.0)				
総計	587	1,091	3,030	6,893	9,377	7,424	3,725	1,408	436	190	34,161	810	34,971	4.59	1.59
(%)	(1.7)	(3.2)	(8.9)	(20.2)	(27.4)	(21.7)	(10.9)	(4.1)	(1.3)	(0.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査