

表 2719 体重減少率(%) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											60	11	11		
20～ (%)	3 (5.0)	1 (1.7)	6 (10.0)	7 (11.7)	10 (16.7)	10 (16.7)	14 (23.3)	6 (10.0)	2 (3.3)	1 (1.7)	60 (100.0)	7	67	5.06	2.07
30～ (%)	54 (2.3)	82 (3.4)	150 (6.3)	350 (14.6)	493 (20.6)	517 (21.6)	392 (16.4)	217 (9.1)	88 (3.7)	49 (2.0)	2,392 (100.0)	4	2,396	5.10	1.91
40～ (%)	164 (1.8)	294 (3.3)	697 (7.8)	1,550 (17.3)	2,159 (24.1)	2,156 (24.1)	1,205 (13.5)	501 (5.6)	154 (1.7)	61 (0.7)	8,941 (100.0)	12	8,953	4.78	1.66
50～ (%)	190 (1.7)	340 (3.1)	1,029 (9.4)	2,202 (20.0)	3,080 (28.0)	2,357 (21.4)	1,185 (10.8)	427 (3.9)	134 (1.2)	57 (0.5)	11,001 (100.0)	7	11,008	4.57	1.58
60～ (%)	119 (1.6)	245 (3.4)	726 (10.0)	1,606 (22.2)	2,175 (30.1)	1,460 (20.2)	638 (8.8)	190 (2.6)	52 (0.7)	18 (0.2)	7,229 (100.0)	2	7,231	4.41	1.47
70～ (%)	39 (1.3)	94 (3.2)	267 (9.2)	746 (25.6)	908 (31.2)	581 (20.0)	220 (7.6)	49 (1.7)	4 (0.1)	2 (0.1)	2,910 (100.0)		2,910	4.31	1.33
80～ (%)	13 (1.2)	25 (2.3)	104 (9.7)	270 (25.2)	354 (33.1)	237 (22.1)	51 (4.8)	15 (1.4)		2 (0.2)	1,071 (100.0)	2	1,073	4.29	1.24
90～ (%)	3 (0.8)	7 (1.9)	34 (9.2)	103 (27.8)	125 (33.7)	77 (20.8)	18 (4.9)	3 (0.8)	1 (0.3)		371 (100.0)		371	4.28	1.19
100～ (%)	1 (0.9)		10 (9.2)	36 (33.0)	41 (37.6)	20 (18.3)	1 (0.9)				109 (100.0)		109	4.20	0.96
110～ (%)		2 (4.3)	4 (8.7)	11 (23.9)	23 (50.0)	5 (10.9)	1 (2.2)				46 (100.0)		46	4.18	0.97
120～ (%)	1 (3.2)	1 (3.2)	3 (9.7)	12 (38.7)	9 (29.0)	4 (12.9)			1 (3.2)		31 (100.0)		31	4.01	1.34
合計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	45	34,206	4.59	1.59
記載なし (%)												765	765		
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	54.49	56.03	57.52	58.43	57.94	55.71	52.93	50.63	48.98	47.98	56.38	35.68	56.35		
標準偏差	12.22	12.30	12.57	13.42	13.05	12.64	11.30	10.63	10.08	9.98	12.85	20.44	12.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査