

表 2721 体重減少率(%) 透析後体重(kg)別(血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												3	3		
20～ (%)	3 (5.4)	1 (1.8)	6 (10.7)	7 (12.5)	9 (16.1)	9 (16.1)	14 (25.0)	4 (7.1)	2 (3.6)	1 (1.8)	56 (100.0)	5	61	4.96	2.08
30～ (%)	48 (2.2)	66 (3.1)	133 (6.2)	309 (14.4)	448 (20.9)	474 (22.1)	351 (16.4)	191 (8.9)	78 (3.6)	42 (2.0)	2,140 (100.0)	2	2,142	5.11	1.89
40～ (%)	101 (1.7)	181 (3.1)	451 (7.8)	1,065 (18.3)	1,431 (24.6)	1,439 (24.8)	757 (13.0)	285 (4.9)	75 (1.3)	28 (0.5)	5,813 (100.0)	7	5,820	4.72	1.60
50～ (%)	52 (1.6)	117 (3.5)	354 (10.6)	755 (22.7)	1,004 (30.2)	677 (20.4)	273 (8.2)	64 (1.9)	19 (0.6)	10 (0.3)	3,325 (100.0)		3,325	4.36	1.45
60～ (%)	17 (1.6)	51 (4.7)	125 (11.4)	305 (27.9)	353 (32.3)	170 (15.5)	50 (4.6)	19 (1.7)	3 (0.3)	1 (0.1)	1,094 (100.0)		1,094	4.11	1.33
70～ (%)	2 (0.6)	16 (5.0)	41 (12.9)	104 (32.7)	93 (29.2)	47 (14.8)	12 (3.8)	2 (0.6)		1 (0.3)	318 (100.0)		318	4.01	1.21
80～ (%)	1 (0.8)	3 (2.4)	25 (19.8)	32 (25.4)	40 (31.7)	19 (15.1)	3 (2.4)	3 (2.4)			126 (100.0)		126	4.00	1.24
90～ (%)		1 (4.8)	3 (14.3)	8 (38.1)	7 (33.3)	2 (9.5)					21 (100.0)		21	3.77	1.12
100～ (%)			1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)						3 (100.0)		3	3.33	1.09
110～ (%)			2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)						4 (100.0)		4	3.29	1.00
120～ (%)															
合計 (%)	224 (1.7)	436 (3.4)	1,141 (8.8)	2,587 (20.1)	3,387 (26.3)	2,837 (22.0)	1,460 (11.3)	568 (4.4)	177 (1.4)	83 (0.6)	12,900 (100.0)	17	12,917	4.61	1.62
記載なし (%)												278	278		
総計 (%)	224 (1.7)	436 (3.4)	1,141 (8.8)	2,587 (20.1)	3,387 (26.3)	2,837 (22.0)	1,460 (11.3)	568 (4.4)	177 (1.4)	83 (0.6)	12,900 (100.0)	295	13,195	4.61	1.62
平均	46.59	49.90	51.11	50.87	50.07	47.58	45.19	43.53	41.92	41.72	48.70	30.36	48.68		
標準偏差	9.19	10.36	11.34	10.70	10.07	8.84	7.90	7.73	6.59	7.87	9.99	12.73	10.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査