

表 2726 体重減少率(%) 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)			2 (66.7)	1 (33.3)							3 (100.0)		3	2.74	0.62
2～ (%)	16 (11.1)	22 (15.3)	24 (16.7)	33 (22.9)	19 (13.2)	12 (8.3)	9 (6.3)	7 (4.9)	2 (1.4)		144 (100.0)	3	147	3.42	1.99
4～ (%)	63 (6.9)	85 (9.4)	145 (16.0)	200 (22.1)	149 (16.4)	128 (14.1)	81 (8.9)	35 (3.9)	16 (1.8)	5 (0.6)	907 (100.0)	11	918	3.91	1.96
6～ (%)	118 (3.2)	184 (5.0)	397 (10.7)	774 (20.8)	836 (22.5)	720 (19.4)	412 (11.1)	181 (4.9)	62 (1.7)	33 (0.9)	3,717 (100.0)	33	3,750	4.46	1.81
8～ (%)	153 (1.8)	300 (3.5)	783 (9.0)	1,769 (20.4)	2,290 (26.4)	1,850 (21.3)	970 (11.2)	381 (4.4)	130 (1.5)	64 (0.7)	8,690 (100.0)	57	8,747	4.61	1.65
10～ (%)	122 (1.2)	266 (2.6)	859 (8.5)	2,060 (20.4)	2,837 (28.1)	2,220 (22.0)	1,130 (11.2)	426 (4.2)	123 (1.2)	50 (0.5)	10,093 (100.0)	54	10,147	4.64	1.52
12～ (%)	79 (1.2)	145 (2.2)	505 (7.6)	1,296 (19.6)	2,063 (31.2)	1,504 (22.8)	680 (10.3)	237 (3.6)	73 (1.1)	22 (0.3)	6,604 (100.0)	34	6,638	4.63	1.44
14～ (%)	26 (0.9)	58 (2.1)	219 (7.8)	540 (19.2)	827 (29.5)	675 (24.1)	326 (11.6)	99 (3.5)	23 (0.8)	13 (0.5)	2,806 (100.0)	14	2,820	4.69	1.44
16～ (%)	5 (0.5)	13 (1.3)	71 (6.8)	184 (17.7)	325 (31.3)	289 (27.8)	106 (10.2)	39 (3.8)	6 (0.6)	2 (0.2)	1,040 (100.0)	8	1,048	4.76	1.31
合計 (%)	582 (1.7)	1,073 (3.2)	3,005 (8.8)	6,857 (20.2)	9,346 (27.5)	7,398 (21.8)	3,714 (10.9)	1,405 (4.1)	435 (1.3)	189 (0.6)	34,004 (100.0)	214	34,218	4.59	1.58
記載なし (%)	5 (3.2)	18 (11.5)	25 (15.9)	36 (22.9)	31 (19.7)	26 (16.6)	11 (7.0)	3 (1.9)	1 (0.6)	1 (0.6)	157 (100.0)	596	753	3.92	1.70
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	9.21	9.62	10.30	10.63	11.02	10.97	10.74	10.48	10.23	9.97	10.72	10.18	10.72		
標準偏差	2.84	2.79	2.75	2.63	2.58	2.63	2.63	2.61	2.46	2.34	2.66	2.86	2.66		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査