

表 2734 体重減少率(%) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| nPCR         | 1.0未満        | 1.0～         | 2.0～           | 3.0～            | 4.0～            | 5.0～            | 6.0～            | 7.0～         | 8.0～         | 9.0～         | 合計                | 記載なし | 総計     | 平均   | 標準偏差 |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------|--------|------|------|
| 0.4未満<br>(%) | 5<br>(25.0)  | 2<br>(10.0)  | 3<br>(15.0)    | 4<br>(20.0)     | 2<br>(10.0)     | 2<br>(10.0)     | 2<br>(10.0)     |              |              |              | 20<br>(100.0)     |      | 20     | 2.96 | 2.13 |
| 0.4～<br>(%)  | 63<br>(8.7)  | 95<br>(13.1) | 137<br>(18.8)  | 195<br>(26.8)   | 130<br>(17.9)   | 73<br>(10.0)    | 22<br>(3.0)     | 8<br>(1.1)   | 2<br>(0.3)   | 2<br>(0.3)   | 727<br>(100.0)    | 1    | 728    | 3.32 | 1.68 |
| 0.6～<br>(%)  | 158<br>(2.6) | 295<br>(4.9) | 839<br>(13.8)  | 1,591<br>(26.2) | 1,684<br>(27.7) | 976<br>(16.1)   | 396<br>(6.5)    | 101<br>(1.7) | 26<br>(0.4)  | 12<br>(0.2)  | 6,078<br>(100.0)  | 1    | 6,079  | 4.07 | 1.49 |
| 0.8～<br>(%)  | 95<br>(1.0)  | 199<br>(2.1) | 663<br>(7.0)   | 1,904<br>(20.0) | 2,911<br>(30.6) | 2,242<br>(23.6) | 998<br>(10.5)   | 365<br>(3.8) | 95<br>(1.0)  | 32<br>(0.3)  | 9,504<br>(100.0)  | 1    | 9,505  | 4.67 | 1.43 |
| 1.0～<br>(%)  | 22<br>(0.6)  | 22<br>(0.6)  | 147<br>(4.1)   | 441<br>(12.2)   | 951<br>(26.4)   | 998<br>(27.7)   | 639<br>(17.7)   | 256<br>(7.1) | 92<br>(2.6)  | 38<br>(1.1)  | 3,606<br>(100.0)  | 7    | 3,613  | 5.26 | 1.48 |
| 1.2～<br>(%)  | 1<br>(0.2)   | 2<br>(0.4)   | 18<br>(3.2)    | 38<br>(6.7)     | 103<br>(18.2)   | 153<br>(27.0)   | 126<br>(22.2)   | 75<br>(13.2) | 33<br>(5.8)  | 18<br>(3.2)  | 567<br>(100.0)    | 2    | 569    | 5.88 | 1.63 |
| 1.4～<br>(%)  | 1<br>(2.2)   |              | 3<br>(6.7)     | 2<br>(4.4)      | 8<br>(17.8)     | 8<br>(17.8)     | 10<br>(22.2)    | 5<br>(11.1)  | 6<br>(13.3)  | 2<br>(4.4)   | 45<br>(100.0)     | 3    | 48     | 6.02 | 2.12 |
| 1.6～<br>(%)  |              |              |                |                 | 1<br>(50.0)     |                 | 1<br>(50.0)     |              |              |              | 2<br>(100.0)      | 3    | 5      | 5.13 | 1.38 |
| 1.8～<br>(%)  |              |              |                |                 |                 |                 |                 |              |              |              |                   |      |        |      |      |
| 2.0～<br>(%)  |              |              |                |                 | 1<br>(100.0)    |                 |                 |              |              |              | 1<br>(100.0)      | 2    | 3      | 4.86 |      |
| 合計<br>(%)    | 345<br>(1.7) | 615<br>(3.0) | 1,810<br>(8.8) | 4,175<br>(20.3) | 5,791<br>(28.2) | 4,452<br>(21.7) | 2,194<br>(10.7) | 810<br>(3.9) | 254<br>(1.2) | 104<br>(0.5) | 20,550<br>(100.0) | 20   | 20,570 | 4.58 | 1.56 |
| 記載なし<br>(%)  | 18<br>(2.5)  | 40<br>(5.6)  | 79<br>(11.1)   | 131<br>(18.4)   | 199<br>(28.0)   | 135<br>(19.0)   | 71<br>(10.0)    | 30<br>(4.2)  | 5<br>(0.7)   | 3<br>(0.4)   | 711<br>(100.0)    | 495  | 1,206  | 4.38 | 1.67 |
| 総計<br>(%)    | 363<br>(1.7) | 655<br>(3.1) | 1,889<br>(8.9) | 4,306<br>(20.3) | 5,990<br>(28.2) | 4,587<br>(21.6) | 2,265<br>(10.7) | 840<br>(4.0) | 259<br>(1.2) | 107<br>(0.5) | 21,261<br>(100.0) | 515  | 21,776 | 4.58 | 1.57 |
| 平均           | 0.73         | 0.75         | 0.79           | 0.83            | 0.87            | 0.90            | 0.94            | 0.97         | 1.01         | 1.01         | 0.87              | 1.36 | 0.87   |      |      |
| 標準偏差         | 0.17         | 0.14         | 0.15           | 0.14            | 0.15            | 0.15            | 0.16            | 0.17         | 0.18         | 0.20         | 0.16              | 0.55 | 0.16   |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査