

表 2735 体重減少率(%) nPCR(g/kg/day)別(血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	7 (30.4)	3 (13.0)	5 (21.7)	3 (13.0)	3 (13.0)	1 (4.3)	1 (4.3)				23 (100.0)		23	2.37	1.78
0.4～ (%)	43 (10.7)	67 (16.7)	85 (21.1)	96 (23.9)	49 (12.2)	45 (11.2)	10 (2.5)	5 (1.2)	2 (0.5)		402 (100.0)		402	3.09	1.72
0.6～ (%)	78 (2.6)	173 (5.8)	412 (13.8)	769 (25.7)	763 (25.5)	513 (17.1)	199 (6.6)	61 (2.0)	19 (0.6)	7 (0.2)	2,994 (100.0)		2,994	4.08	1.54
0.8～ (%)	66 (1.2)	145 (2.7)	431 (8.0)	1,082 (20.1)	1,528 (28.4)	1,217 (22.6)	588 (10.9)	228 (4.2)	59 (1.1)	31 (0.6)	5,375 (100.0)		5,375	4.65	1.51
1.0～ (%)	18 (0.6)	21 (0.7)	128 (4.4)	465 (16.0)	772 (26.5)	780 (26.8)	450 (15.4)	189 (6.5)	68 (2.3)	24 (0.8)	2,915 (100.0)	3	2,918	5.13	1.50
1.2～ (%)	1 (0.2)	2 (0.3)	12 (2.0)	61 (10.3)	131 (22.1)	150 (25.3)	149 (25.1)	54 (9.1)	18 (3.0)	15 (2.5)	593 (100.0)	5	598	5.62	1.49
1.4～ (%)				7 (8.9)	16 (20.3)	22 (27.8)	16 (20.3)	8 (10.1)	7 (8.9)	3 (3.8)	79 (100.0)	1	80	5.98	1.55
1.6～ (%)				1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	2 (25.0)	2 (25.0)			8 (100.0)		8	5.90	1.19
1.8～ (%)												1	1		
2.0～ (%)						1 (100.0)					1 (100.0)	2	3	4.76	
合計 (%)	213 (1.7)	411 (3.3)	1,073 (8.7)	2,484 (20.0)	3,264 (26.3)	2,730 (22.0)	1,415 (11.4)	547 (4.4)	173 (1.4)	80 (0.6)	12,390 (100.0)	12	12,402	4.62	1.61
記載なし (%)	11 (2.2)	25 (4.9)	68 (13.3)	103 (20.2)	123 (24.1)	107 (21.0)	45 (8.8)	21 (4.1)	4 (0.8)	3 (0.6)	510 (100.0)	283	793	4.39	1.73
総計 (%)	224 (1.7)	436 (3.4)	1,141 (8.8)	2,587 (20.1)	3,387 (26.3)	2,837 (22.0)	1,460 (11.3)	568 (4.4)	177 (1.4)	83 (0.6)	12,900 (100.0)	295	13,195	4.61	1.62
平均	0.74	0.76	0.81	0.87	0.91	0.94	0.97	0.99	1.01	1.03	0.90	1.53	0.90		
標準偏差	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20	0.18	0.62	0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査