

表 2736 体重減少率(%) %クレアチニン産生速度(%)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	118 (7.2)	158 (9.7)	262 (16.0)	372 (22.8)	312 (19.1)	219 (13.4)	116 (7.1)	55 (3.4)	16 (1.0)	6 (0.4)	1,634 (100.0)		1,634	3.78	1.86
60～ (%)	78 (5.6)	95 (6.8)	174 (12.4)	312 (22.2)	311 (22.2)	215 (15.3)	137 (9.8)	58 (4.1)	14 (1.0)	9 (0.6)	1,403 (100.0)	1	1,404	4.13	1.85
70～ (%)	85 (3.4)	127 (5.1)	268 (10.8)	554 (22.4)	613 (24.7)	439 (17.7)	245 (9.9)	99 (4.0)	33 (1.3)	14 (0.6)	2,477 (100.0)	1	2,478	4.34	1.74
80～ (%)	80 (2.1)	144 (3.7)	384 (9.9)	842 (21.8)	1,008 (26.1)	768 (19.9)	385 (10.0)	169 (4.4)	62 (1.6)	26 (0.7)	3,868 (100.0)		3,868	4.51	1.67
90～ (%)	67 (1.3)	147 (2.9)	472 (9.3)	1,050 (20.6)	1,318 (25.8)	1,103 (21.6)	618 (12.1)	229 (4.5)	68 (1.3)	27 (0.5)	5,099 (100.0)	1	5,100	4.64	1.57
100～ (%)	48 (0.8)	135 (2.3)	477 (8.2)	1,171 (20.1)	1,650 (28.3)	1,354 (23.2)	636 (10.9)	233 (4.0)	88 (1.5)	41 (0.7)	5,833 (100.0)	1	5,834	4.70	1.50
110～ (%)	42 (0.8)	103 (1.9)	378 (7.0)	978 (18.1)	1,648 (30.5)	1,270 (23.5)	655 (12.1)	229 (4.2)	71 (1.3)	24 (0.4)	5,398 (100.0)	1	5,399	4.77	1.46
120～ (%)	29 (0.8)	65 (1.7)	250 (6.5)	722 (18.8)	1,146 (29.8)	943 (24.6)	464 (12.1)	162 (4.2)	41 (1.1)	19 (0.5)	3,841 (100.0)	2	3,843	4.78	1.41
130～ (%)	8 (0.4)	35 (1.7)	137 (6.6)	406 (19.4)	634 (30.3)	530 (25.4)	231 (11.1)	83 (4.0)	16 (0.8)	9 (0.4)	2,089 (100.0)	3	2,092	4.78	1.42
140～ (%)	3 (0.2)	17 (1.3)	80 (6.2)	251 (19.4)	414 (32.0)	340 (26.3)	121 (9.4)	40 (3.1)	18 (1.4)	9 (0.7)	1,293 (100.0)	15	1,308	4.77	1.36
合計 (%)	558 (1.7)	1,026 (3.1)	2,882 (8.8)	6,658 (20.2)	9,054 (27.5)	7,181 (21.8)	3,608 (11.0)	1,357 (4.1)	427 (1.3)	184 (0.6)	32,935 (100.0)	25	32,960	4.60	1.58
記載なし (%)	29 (2.4)	65 (5.3)	148 (12.1)	235 (19.2)	323 (26.3)	243 (19.8)	117 (9.5)	51 (4.2)	9 (0.7)	6 (0.5)	1,226 (100.0)	785	2,011	4.38	1.69
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	79.89	87.75	95.77	100.37	104.49	105.36	103.58	101.83	101.75	101.66	101.89	147.81	101.92		
標準偏差	26.90	27.09	25.64	24.03	22.81	22.29	21.84	22.87	23.06	23.42	23.82	46.25	23.87		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査