

表 2739 体重減少率(%) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前アルブミン 濃度	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)		3 (33.3)		1 (11.1)	3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)				9 (100.0)	1	10	3.73	1.90
1.5～ (%)	6 (14.0)	6 (14.0)	10 (23.3)	12 (27.9)	1 (2.3)	6 (14.0)	2 (4.7)				43 (100.0)		43	3.05	1.63
2.0～ (%)	27 (11.5)	19 (8.1)	45 (19.1)	51 (21.7)	35 (14.9)	27 (11.5)	23 (9.8)	6 (2.6)	1 (0.4)	1 (0.4)	235 (100.0)	4	239	3.56	2.00
2.5～ (%)	46 (3.9)	79 (6.7)	157 (13.3)	258 (21.9)	271 (23.0)	197 (16.7)	102 (8.7)	48 (4.1)	15 (1.3)	6 (0.5)	1,179 (100.0)	13	1,192	4.19	1.77
3.0～ (%)	108 (1.4)	257 (3.4)	737 (9.6)	1,628 (21.3)	2,110 (27.5)	1,561 (20.4)	787 (10.3)	335 (4.4)	90 (1.2)	47 (0.6)	7,660 (100.0)	54	7,714	4.56	1.59
3.5～ (%)	242 (1.3)	480 (2.7)	1,461 (8.1)	3,607 (20.1)	5,028 (28.0)	4,025 (22.4)	2,074 (11.5)	733 (4.1)	225 (1.3)	99 (0.6)	17,974 (100.0)	107	18,081	4.65	1.54
4.0～ (%)	128 (2.0)	200 (3.2)	539 (8.6)	1,162 (18.6)	1,732 (27.7)	1,433 (22.9)	660 (10.6)	261 (4.2)	95 (1.5)	36 (0.6)	6,246 (100.0)	37	6,283	4.62	1.60
4.5～ (%)	19 (6.9)	14 (5.1)	27 (9.9)	47 (17.2)	65 (23.7)	62 (22.6)	27 (9.9)	10 (3.6)	3 (1.1)		274 (100.0)	1	275	4.24	1.87
5.0～ (%)				1 (6.7)	7 (46.7)	5 (33.3)	2 (13.3)				15 (100.0)		15	4.93	0.90
合計 (%)	576 (1.7)	1,058 (3.1)	2,976 (8.8)	6,767 (20.1)	9,252 (27.5)	7,317 (21.8)	3,678 (10.9)	1,393 (4.1)	429 (1.3)	189 (0.6)	33,635 (100.0)	217	33,852	4.60	1.59
記載なし (%)	11 (2.1)	33 (6.3)	54 (10.3)	126 (24.0)	125 (23.8)	107 (20.3)	47 (8.9)	15 (2.9)	7 (1.3)	1 (0.2)	526 (100.0)	593	1,119	4.32	1.58
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	3.58	3.57	3.59	3.62	3.65	3.66	3.65	3.65	3.67	3.63	3.64	3.55	3.64		
標準偏差	0.57	0.49	0.43	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.45	0.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査