

表 2740 体重減少率(%) 透析前CRP濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前CRP濃度	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満	283	513	1,395	3,432	4,925	4,171	2,127	818	253	100	18,017	64	18,081	4.69	1.58
(%)	(1.6)	(2.8)	(7.7)	(19.0)	(27.3)	(23.2)	(11.8)	(4.5)	(1.4)	(0.6)	(100.0)				
0.2～	93	187	530	1,235	1,626	1,186	579	196	50	28	5,710	20	5,730	4.51	1.53
(%)	(1.6)	(3.3)	(9.3)	(21.6)	(28.5)	(20.8)	(10.1)	(3.4)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				
0.5～	52	96	266	549	789	579	253	108	41	19	2,752	18	2,770	4.53	1.63
(%)	(1.9)	(3.5)	(9.7)	(19.9)	(28.7)	(21.0)	(9.2)	(3.9)	(1.5)	(0.7)	(100.0)				
1.0～	31	68	202	384	473	340	175	59	23	7	1,762	4	1,766	4.42	1.57
(%)	(1.8)	(3.9)	(11.5)	(21.8)	(26.8)	(19.3)	(9.9)	(3.3)	(1.3)	(0.4)	(100.0)				
2.0～	24	51	132	225	245	174	97	36	10	4	998	9	1,007	4.28	1.66
(%)	(2.4)	(5.1)	(13.2)	(22.5)	(24.5)	(17.4)	(9.7)	(3.6)	(1.0)	(0.4)	(100.0)				
4.0～	15	16	35	80	97	52	39	14	3	1	352	3	355	4.28	1.70
(%)	(4.3)	(4.5)	(9.9)	(22.7)	(27.6)	(14.8)	(11.1)	(4.0)	(0.9)	(0.3)	(100.0)				
6.0～	2	5	20	34	34	27	12	9	2	3	148	2	150	4.54	1.74
(%)	(1.4)	(3.4)	(13.5)	(23.0)	(23.0)	(18.2)	(8.1)	(6.1)	(1.4)	(2.0)	(100.0)				
8.0～	5	5	15	21	15	12	10	1			84	1	85	3.90	1.73
(%)	(6.0)	(6.0)	(17.9)	(25.0)	(17.9)	(14.3)	(11.9)	(1.2)			(100.0)				
10.0～	8	6	16	16	25	11	3	4	1		90	1	91	3.71	1.83
(%)	(8.9)	(6.7)	(17.8)	(17.8)	(27.8)	(12.2)	(3.3)	(4.4)	(1.1)		(100.0)				
15.0～	2	10	9	16	14	15	6	2		1	75		75	4.11	2.13
(%)	(2.7)	(13.3)	(12.0)	(21.3)	(18.7)	(20.0)	(8.0)	(2.7)		(1.3)	(100.0)				
合計	515	957	2,620	5,992	8,243	6,567	3,301	1,247	383	163	29,988	122	30,110	4.60	1.59
(%)	(1.7)	(3.2)	(8.7)	(20.0)	(27.5)	(21.9)	(11.0)	(4.2)	(1.3)	(0.5)	(100.0)				
記載なし	72	134	410	901	1,134	857	424	161	53	27	4,173	688	4,861	4.53	1.59
(%)	(1.7)	(3.2)	(9.8)	(21.6)	(27.2)	(20.5)	(10.2)	(3.9)	(1.3)	(0.6)	(100.0)				
総計	587	1,091	3,030	6,893	9,377	7,424	3,725	1,408	436	190	34,161	810	34,971	4.59	1.59
(%)	(1.7)	(3.2)	(8.9)	(20.2)	(27.4)	(21.7)	(10.9)	(4.1)	(1.3)	(0.6)	(100.0)				
平均	0.93	0.89	0.73	0.58	0.52	0.47	0.48	0.47	0.40	0.73	0.55	0.87	0.55		
標準偏差	2.63	2.79	1.82	1.59	1.77	1.56	1.67	1.29	0.95	3.53	1.74	1.84	1.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査