

表 2741 体重減少率(%) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	1 (0.7)	3 (2.2)	9 (6.7)	21 (15.6)	41 (30.4)	29 (21.5)	18 (13.3)	8 (5.9)	4 (3.0)	1 (0.7)	135 (100.0)		135	4.92	1.58
7.0～ (%)	6 (2.7)	7 (3.2)	12 (5.4)	33 (14.9)	57 (25.8)	49 (22.2)	38 (17.2)	13 (5.9)	5 (2.3)	1 (0.5)	221 (100.0)	1	222	4.91	1.72
7.5～ (%)	5 (0.7)	19 (2.5)	61 (8.0)	132 (17.2)	205 (26.7)	177 (23.1)	111 (14.5)	40 (5.2)	14 (1.8)	3 (0.4)	767 (100.0)	8	775	4.83	1.52
8.0～ (%)	30 (1.3)	59 (2.5)	176 (7.5)	401 (17.1)	657 (28.1)	524 (22.4)	318 (13.6)	114 (4.9)	43 (1.8)	18 (0.8)	2,340 (100.0)	13	2,353	4.80	1.61
8.4～ (%)	9 (1.3)	18 (2.7)	59 (8.7)	113 (16.7)	179 (26.5)	159 (23.6)	81 (12.0)	35 (5.2)	14 (2.1)	8 (1.2)	675 (100.0)	4	679	4.79	1.65
8.5～ (%)	126 (1.6)	210 (2.7)	595 (7.7)	1,538 (20.0)	2,148 (27.9)	1,750 (22.8)	836 (10.9)	336 (4.4)	111 (1.4)	42 (0.5)	7,692 (100.0)	61	7,753	4.66	1.56
9.0～ (%)	185 (1.8)	319 (3.2)	919 (9.1)	2,049 (20.3)	2,827 (28.0)	2,180 (21.6)	1,063 (10.5)	395 (3.9)	100 (1.0)	60 (0.6)	10,097 (100.0)	59	10,156	4.56	1.58
9.5～ (%)	111 (1.6)	237 (3.4)	662 (9.5)	1,451 (20.9)	1,902 (27.4)	1,470 (21.2)	724 (10.4)	288 (4.1)	72 (1.0)	29 (0.4)	6,946 (100.0)	32	6,978	4.54	1.56
10.0～ (%)	16 (1.9)	27 (3.2)	85 (10.2)	177 (21.2)	212 (25.5)	189 (22.7)	92 (11.0)	24 (2.9)	9 (1.1)	2 (0.2)	833 (100.0)	4	837	4.49	1.53
10.1～ (%)	52 (2.3)	86 (3.8)	208 (9.2)	474 (20.9)	622 (27.4)	459 (20.2)	242 (10.7)	76 (3.4)	37 (1.6)	12 (0.5)	2,268 (100.0)	16	2,284	4.50	1.61
10.5～ (%)	15 (1.4)	45 (4.1)	125 (11.5)	245 (22.5)	281 (25.8)	223 (20.4)	105 (9.6)	33 (3.0)	9 (0.8)	10 (0.9)	1,091 (100.0)	12	1,103	4.44	1.63
11.0～ (%)	12 (3.4)	17 (4.8)	38 (10.7)	72 (20.3)	81 (22.8)	72 (20.3)	32 (9.0)	20 (5.6)	9 (2.5)	2 (0.6)	355 (100.0)	2	357	4.50	1.75
11.5～ (%)	6 (5.5)	5 (4.5)	11 (10.0)	30 (27.3)	23 (20.9)	16 (14.5)	11 (10.0)	6 (5.5)	2 (1.8)		110 (100.0)	2	112	4.25	1.79
12.0～ (%)	1 (1.6)	4 (6.3)	13 (20.3)	18 (28.1)	8 (12.5)	12 (18.8)	4 (6.3)	4 (6.3)			64 (100.0)	1	65	4.04	1.56
合計 (%)	575 (1.7)	1,056 (3.1)	2,973 (8.8)	6,754 (20.1)	9,243 (27.5)	7,309 (21.8)	3,675 (10.9)	1,392 (4.1)	429 (1.3)	188 (0.6)	33,594 (100.0)	215	33,809	4.60	1.59
記載なし (%)	12 (2.1)	35 (6.2)	57 (10.1)	139 (24.5)	134 (23.6)	115 (20.3)	50 (8.8)	16 (2.8)	7 (1.2)	2 (0.4)	567 (100.0)	595	1,162	4.32	1.58
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	9.31	9.32	9.30	9.26	9.20	9.19	9.16	9.16	9.12	9.14	9.22	9.22	9.22		
標準偏差	0.75	0.79	0.77	0.74	0.73	0.73	0.76	0.78	0.82	0.75	0.75	0.79	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査