

表 2747 体重減少率(%) HDL-C濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

HDL-C濃度	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	4 (5.9)	5 (7.4)	11 (16.2)	19 (27.9)	8 (11.8)	13 (19.1)	6 (8.8)	2 (2.9)			68 (100.0)		68	3.89	1.73
20～ (%)	32 (2.0)	65 (4.1)	210 (13.2)	377 (23.6)	478 (29.9)	308 (19.3)	100 (6.3)	16 (1.0)	8 (0.5)	2 (0.1)	1,596 (100.0)	5	1,601	4.17	1.40
30～ (%)	90 (1.7)	180 (3.5)	526 (10.1)	1,261 (24.2)	1,543 (29.7)	1,023 (19.7)	401 (7.7)	130 (2.5)	36 (0.7)	12 (0.2)	5,202 (100.0)	34	5,236	4.34	1.47
40～ (%)	101 (1.6)	175 (2.7)	605 (9.5)	1,405 (22.0)	1,811 (28.4)	1,377 (21.6)	616 (9.6)	217 (3.4)	51 (0.8)	30 (0.5)	6,388 (100.0)	33	6,421	4.51	1.51
50～ (%)	84 (1.6)	147 (2.8)	443 (8.5)	1,010 (19.3)	1,433 (27.4)	1,185 (22.6)	608 (11.6)	216 (4.1)	70 (1.3)	37 (0.7)	5,233 (100.0)	24	5,257	4.66	1.58
60～ (%)	61 (1.8)	114 (3.3)	257 (7.5)	585 (17.0)	881 (25.6)	776 (22.5)	491 (14.3)	188 (5.5)	66 (1.9)	23 (0.7)	3,442 (100.0)	16	3,458	4.79	1.65
70～ (%)	33 (1.8)	45 (2.5)	144 (7.9)	302 (16.6)	442 (24.3)	430 (23.6)	259 (14.2)	112 (6.1)	39 (2.1)	16 (0.9)	1,822 (100.0)	9	1,831	4.88	1.70
80～ (%)	24 (2.6)	28 (3.0)	57 (6.1)	149 (16.1)	217 (23.4)	222 (23.9)	133 (14.3)	69 (7.4)	21 (2.3)	7 (0.8)	927 (100.0)	1	928	4.87	1.73
90～ (%)	11 (2.8)	18 (4.6)	22 (5.6)	51 (12.9)	87 (22.1)	94 (23.9)	54 (13.7)	38 (9.6)	14 (3.6)	5 (1.3)	394 (100.0)	1	395	5.01	1.90
100～ (%)	3 (0.9)	15 (4.4)	24 (7.0)	51 (14.9)	66 (19.2)	85 (24.8)	59 (17.2)	25 (7.3)	11 (3.2)	4 (1.2)	343 (100.0)	1	344	5.03	1.74
合計 (%)	443 (1.7)	792 (3.1)	2,299 (9.0)	5,210 (20.5)	6,966 (27.4)	5,513 (21.7)	2,727 (10.7)	1,013 (4.0)	316 (1.2)	136 (0.5)	25,415 (100.0)	124	25,539	4.57	1.58
記載なし (%)	144 (1.6)	299 (3.4)	731 (8.4)	1,683 (19.2)	2,411 (27.6)	1,911 (21.8)	998 (11.4)	395 (4.5)	120 (1.4)	54 (0.6)	8,746 (100.0)	686	9,432	4.64	1.61
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	51.31	50.55	48.40	48.77	49.91	52.30	55.41	58.47	60.27	58.77	51.21	48.94	51.20		
標準偏差	18.01	18.18	16.37	16.50	16.52	17.50	17.75	18.53	19.88	18.06	17.30	15.54	17.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査