

表 2749 体重減少率(%) 透析前収縮期血圧(mmHg)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前収縮期血圧	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)							1 (100.0)				1 (100.0)		1	6.70	
60～ (%)	11 (10.0)	6 (5.5)	19 (17.3)	14 (12.7)	27 (24.5)	14 (12.7)	11 (10.0)	5 (4.5)	2 (1.8)	1 (0.9)	110 (100.0)		110	4.03	2.22
80～ (%)	25 (4.5)	44 (7.9)	69 (12.3)	118 (21.1)	148 (26.4)	91 (16.3)	42 (7.5)	14 (2.5)	5 (0.9)	4 (0.7)	560 (100.0)	1	561	4.06	1.76
100～ (%)	64 (2.6)	105 (4.3)	298 (12.1)	602 (24.5)	627 (25.5)	448 (18.2)	232 (9.4)	62 (2.5)	17 (0.7)	7 (0.3)	2,462 (100.0)	12	2,474	4.26	1.58
120～ (%)	124 (1.9)	245 (3.7)	671 (10.1)	1,396 (21.0)	1,857 (27.9)	1,376 (20.7)	668 (10.0)	236 (3.5)	61 (0.9)	28 (0.4)	6,662 (100.0)	13	6,675	4.47	1.56
140～ (%)	172 (1.7)	270 (2.7)	850 (8.5)	2,059 (20.6)	2,767 (27.6)	2,215 (22.1)	1,077 (10.8)	412 (4.1)	139 (1.4)	50 (0.5)	10,011 (100.0)	28	10,039	4.61	1.56
160～ (%)	88 (1.2)	205 (2.8)	565 (7.8)	1,364 (18.8)	2,011 (27.7)	1,701 (23.4)	854 (11.7)	345 (4.7)	91 (1.3)	46 (0.6)	7,270 (100.0)	19	7,289	4.72	1.54
180～ (%)	33 (1.2)	54 (2.0)	191 (7.0)	495 (18.1)	745 (27.3)	647 (23.7)	369 (13.5)	114 (4.2)	59 (2.2)	23 (0.8)	2,730 (100.0)	5	2,735	4.84	1.59
200～ (%)	5 (0.7)	12 (1.7)	43 (6.1)	120 (17.0)	195 (27.7)	167 (23.7)	100 (14.2)	43 (6.1)	11 (1.6)	8 (1.1)	704 (100.0)	2	706	4.96	1.52
220～ (%)	2 (1.1)	5 (2.8)	12 (6.6)	31 (17.1)	42 (23.2)	47 (26.0)	20 (11.0)	12 (6.6)	6 (3.3)	4 (2.2)	181 (100.0)	1	182	5.00	1.76
合計 (%)	524 (1.7)	946 (3.1)	2,718 (8.9)	6,199 (20.2)	8,419 (27.4)	6,706 (21.9)	3,374 (11.0)	1,243 (4.1)	391 (1.3)	171 (0.6)	30,691 (100.0)	81	30,772	4.59	1.58
記載なし (%)	63 (1.8)	145 (4.2)	312 (9.0)	694 (20.0)	958 (27.6)	718 (20.7)	351 (10.1)	165 (4.8)	45 (1.3)	19 (0.5)	3,470 (100.0)	729	4,199	4.56	1.65
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	141.75	144.45	146.14	148.74	150.77	152.41	153.30	154.62	156.96	157.81	150.51	148.60	150.50		
標準偏差	27.27	25.96	25.27	24.82	24.71	24.58	25.09	24.72	25.47	28.06	25.06	25.95	25.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査