

表 2750 体重減少率(%) 透析前拡張期血圧(mmHg)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前拡張 期血圧	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				2 (33.3)	3 (50.0)		1 (16.7)				6 (100.0)		6	4.46	1.16
20～ (%)	6 (5.5)	7 (6.4)	15 (13.6)	27 (24.5)	25 (22.7)	13 (11.8)	13 (11.8)	1 (0.9)	2 (1.8)	1 (0.9)	110 (100.0)	1	111	4.04	1.84
40～ (%)	66 (2.8)	108 (4.6)	286 (12.3)	539 (23.1)	621 (26.7)	425 (18.2)	196 (8.4)	64 (2.7)	18 (0.8)	7 (0.3)	2,330 (100.0)	6	2,336	4.24	1.60
60～ (%)	239 (1.8)	434 (3.3)	1,266 (9.7)	2,830 (21.7)	3,571 (27.4)	2,739 (21.0)	1,299 (10.0)	446 (3.4)	134 (1.0)	66 (0.5)	13,024 (100.0)	37	13,061	4.49	1.56
80～ (%)	111 (1.4)	229 (2.9)	657 (8.3)	1,566 (19.8)	2,199 (27.8)	1,766 (22.3)	903 (11.4)	345 (4.4)	109 (1.4)	33 (0.4)	7,918 (100.0)	19	7,937	4.65	1.55
90～ (%)	73 (1.6)	112 (2.4)	329 (7.1)	846 (18.1)	1,271 (27.3)	1,103 (23.7)	590 (12.7)	231 (5.0)	72 (1.5)	36 (0.8)	4,663 (100.0)	8	4,671	4.78	1.58
100～ (%)	28 (1.2)	47 (2.0)	146 (6.2)	344 (14.5)	662 (28.0)	594 (25.1)	329 (13.9)	140 (5.9)	51 (2.2)	25 (1.1)	2,366 (100.0)	8	2,374	4.98	1.58
120～ (%)	1 (0.7)	3 (2.0)	7 (4.8)	17 (11.6)	39 (26.5)	42 (28.6)	23 (15.6)	9 (6.1)	5 (3.4)	1 (0.7)	147 (100.0)	2	149	5.15	1.56
140～ (%)	1 (11.1)			1 (11.1)		2 (22.2)	4 (44.4)	1 (11.1)			9 (100.0)		9	5.46	2.06
合計 (%)	525 (1.7)	940 (3.1)	2,706 (8.9)	6,172 (20.2)	8,391 (27.4)	6,684 (21.9)	3,358 (11.0)	1,237 (4.0)	391 (1.3)	169 (0.6)	30,573 (100.0)	81	30,654	4.59	1.58
記載なし (%)	62 (1.7)	151 (4.2)	324 (9.0)	721 (20.1)	986 (27.5)	740 (20.6)	367 (10.2)	171 (4.8)	45 (1.3)	21 (0.6)	3,588 (100.0)	729	4,317	4.56	1.65
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	75.70	76.04	76.48	77.67	79.35	80.33	81.18	82.35	83.41	82.98	79.20	78.43	79.20		
標準偏差	16.12	14.84	14.43	14.14	14.51	14.67	14.99	14.79	15.13	16.41	14.69	17.25	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査