

表 2753 Body Mass Index 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	1,403 (0.7)	7,980 (3.7)	25,580 (12.0)	44,889 (21.0)	49,603 (23.2)	38,140 (17.8)	22,716 (10.6)	12,056 (5.6)	6,178 (2.9)	5,339 (2.5)	213,884 (100.0)	41,757	255,641	21.45	3.66
血液透析濾過 （％）	151 (0.4)	1,073 (2.9)	4,116 (11.0)	7,824 (21.0)	8,675 (23.3)	6,750 (18.1)	4,195 (11.3)	2,244 (6.0)	1,205 (3.2)	1,042 (2.8)	37,275 (100.0)	6,008	43,283	21.66	3.64
血液濾過 （％）		2 (2.4)	9 (10.6)	17 (20.0)	26 (30.6)	12 (14.1)	7 (8.2)	4 (4.7)	6 (7.1)	2 (2.4)	85 (100.0)	7	92	21.73	3.66
血液吸着透析 （％）	5 (0.3)	61 (4.1)	263 (17.5)	442 (29.4)	399 (26.5)	195 (13.0)	87 (5.8)	40 (2.7)	9 (0.6)	4 (0.3)	1,505 (100.0)	125	1,630	20.17	2.79
在宅血液透析 （％）		3 (0.9)	27 (8.3)	58 (17.8)	77 (23.7)	63 (19.4)	53 (16.3)	24 (7.4)	16 (4.9)	4 (1.2)	325 (100.0)	196	521	22.30	3.33
腹膜透析 （％）	27 (0.5)	71 (1.3)	228 (4.3)	627 (11.7)	1,140 (21.3)	1,261 (23.6)	908 (17.0)	561 (10.5)	302 (5.7)	220 (4.1)	5,345 (100.0)	3,596	8,941	23.15	3.60
合計 （％）	1,586 (0.6)	9,190 (3.6)	30,223 (11.7)	53,857 (20.8)	59,920 (23.2)	46,421 (18.0)	27,966 (10.8)	14,929 (5.8)	7,716 (3.0)	6,611 (2.6)	258,419 (100.0)	51,689	310,108	21.51	3.66
記載なし （％）															
総計 （％）	1,586 (0.6)	9,190 (3.6)	30,223 (11.7)	53,857 (20.8)	59,920 (23.2)	46,421 (18.0)	27,966 (10.8)	14,929 (5.8)	7,716 (3.0)	6,611 (2.6)	258,419 (100.0)	51,689	310,108	21.51	3.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査