

表 2756 Body Mass Index 性別（透析患者全体）

性別	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	505	3,607	15,248	32,384	40,659	33,144	19,997	10,415	5,210	4,218	165,387	32,754	198,141	21.88	3.50
(%)	(0.3)	(2.2)	(9.2)	(19.6)	(24.6)	(20.0)	(12.1)	(6.3)	(3.2)	(2.6)	(100.0)				
女性	1,081	5,583	14,975	21,473	19,261	13,277	7,969	4,514	2,506	2,393	93,032	18,935	111,967	20.85	3.83
(%)	(1.2)	(6.0)	(16.1)	(23.1)	(20.7)	(14.3)	(8.6)	(4.9)	(2.7)	(2.6)	(100.0)				
合計	1,586	9,190	30,223	53,857	59,920	46,421	27,966	14,929	7,716	6,611	258,419	51,689	310,108	21.51	3.66
(%)	(0.6)	(3.6)	(11.7)	(20.8)	(23.2)	(18.0)	(10.8)	(5.8)	(3.0)	(2.6)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	1,586	9,190	30,223	53,857	59,920	46,421	27,966	14,929	7,716	6,611	258,419	51,689	310,108	21.51	3.66
(%)	(0.6)	(3.6)	(11.7)	(20.8)	(23.2)	(18.0)	(10.8)	(5.8)	(3.0)	(2.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査