

表 2759 Body Mass Index 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	565	3,365	11,640	19,620	19,807	13,509	7,192	3,375	1,541	1,262	81,876	15,094	96,970	20.89	3.39
（％）	(0.7)	(4.1)	(14.2)	(24.0)	(24.2)	(16.5)	(8.8)	(4.1)	(1.9)	(1.5)	(100.0)				
慢性腎盂腎炎	45	168	421	602	570	387	189	99	38	36	2,555	487	3,042	20.43	3.51
（％）	(1.8)	(6.6)	(16.5)	(23.6)	(22.3)	(15.1)	(7.4)	(3.9)	(1.5)	(1.4)	(100.0)				
急速進行性糸球体腎炎	16	142	354	558	496	277	133	52	31	18	2,077	417	2,494	20.18	3.21
（％）	(0.8)	(6.8)	(17.0)	(26.9)	(23.9)	(13.3)	(6.4)	(2.5)	(1.5)	(0.9)	(100.0)				
妊娠腎/妊娠中毒症	12	88	239	369	306	194	110	62	33	32	1,445	169	1,614	20.65	3.69
（％）	(0.8)	(6.1)	(16.5)	(25.5)	(21.2)	(13.4)	(7.6)	(4.3)	(2.3)	(2.2)	(100.0)				
その他の分類不能の腎炎	14	61	165	303	266	154	106	63	21	11	1,164	209	1,373	20.70	3.46
（％）	(1.2)	(5.2)	(14.2)	(26.0)	(22.9)	(13.2)	(9.1)	(5.4)	(1.8)	(0.9)	(100.0)				
多発性嚢胞腎	26	212	933	2,115	2,628	1,869	918	412	188	128	9,429	1,577	11,006	21.35	3.13
（％）	(0.3)	(2.2)	(9.9)	(22.4)	(27.9)	(19.8)	(9.7)	(4.4)	(2.0)	(1.4)	(100.0)				
腎硬化症	153	959	2,931	5,063	5,729	4,236	2,465	1,192	583	465	23,776	4,522	28,298	21.27	3.53
（％）	(0.6)	(4.0)	(12.3)	(21.3)	(24.1)	(17.8)	(10.4)	(5.0)	(2.5)	(2.0)	(100.0)				
悪性高血圧	12	78	216	407	446	391	263	157	93	89	2,152	421	2,573	22.02	3.96
（％）	(0.6)	(3.6)	(10.0)	(18.9)	(20.7)	(18.2)	(12.2)	(7.3)	(4.3)	(4.1)	(100.0)				
糖尿病性腎症	382	2,220	8,078	16,614	21,371	19,506	13,321	7,864	4,393	3,906	97,655	20,426	118,081	22.39	3.81
（％）	(0.4)	(2.3)	(8.3)	(17.0)	(21.9)	(20.0)	(13.6)	(8.1)	(4.5)	(4.0)	(100.0)				
SLE腎炎	33	129	406	509	375	219	117	43	23	25	1,879	357	2,236	19.90	3.37
（％）	(1.8)	(6.9)	(21.6)	(27.1)	(20.0)	(11.7)	(6.2)	(2.3)	(1.2)	(1.3)	(100.0)				
アミロイド腎	8	34	73	99	75	36	26	10	3		364	87	451	19.61	3.15
（％）	(2.2)	(9.3)	(20.1)	(27.2)	(20.6)	(9.9)	(7.1)	(2.7)	(0.8)		(100.0)				
痛風腎	6	25	90	210	249	176	104	52	23	15	950	163	1,113	21.46	3.40
（％）	(0.6)	(2.6)	(9.5)	(22.1)	(26.2)	(18.5)	(10.9)	(5.5)	(2.4)	(1.6)	(100.0)				
先天性代謝異常による腎不全	5	18	41	43	56	34	11	9	7	10	234	38	272	20.68	4.15
（％）	(2.1)	(7.7)	(17.5)	(18.4)	(23.9)	(14.5)	(4.7)	(3.8)	(3.0)	(4.3)	(100.0)				
腎・尿路結核	1	21	30	36	46	20	16	3	1	1	175	31	206	20.05	3.21
（％）	(0.6)	(12.0)	(17.1)	(20.6)	(26.3)	(11.4)	(9.1)	(1.7)	(0.6)	(0.6)	(100.0)				
腎・尿路結石	6	23	56	116	120	84	46	20	13	8	492	89	581	21.09	3.59
（％）	(1.2)	(4.7)	(11.4)	(23.6)	(24.4)	(17.1)	(9.3)	(4.1)	(2.6)	(1.6)	(100.0)				
腎・尿路腫瘍	3	27	95	156	185	142	75	30	14	9	736	150	886	21.12	3.25
（％）	(0.4)	(3.7)	(12.9)	(21.2)	(25.1)	(19.3)	(10.2)	(4.1)	(1.9)	(1.2)	(100.0)				
閉塞性尿路障害	5	34	96	141	137	90	59	28	10	8	608	115	723	20.74	3.48
（％）	(0.8)	(5.6)	(15.8)	(23.2)	(22.5)	(14.8)	(9.7)	(4.6)	(1.6)	(1.3)	(100.0)				
骨髄腫	2	5	37	69	49	41	12	8			223	53	276	20.30	2.70
（％）	(0.9)	(2.2)	(16.6)	(30.9)	(22.0)	(18.4)	(5.4)	(3.6)			(100.0)				
腎形成不全	7	33	75	123	124	89	53	23	13	22	562	87	649	21.09	3.95
（％）	(1.2)	(5.9)	(13.3)	(21.9)	(22.1)	(15.8)	(9.4)	(4.1)	(2.3)	(3.9)	(100.0)				
不明	217	1,122	3,085	4,884	5,004	3,744	2,074	1,073	520	429	22,152	5,392	27,544	21.02	3.61
（％）	(1.0)	(5.1)	(13.9)	(22.0)	(22.6)	(16.9)	(9.4)	(4.8)	(2.3)	(1.9)	(100.0)				
再導入	10	92	299	469	448	253	128	67	33	25	1,824	339	2,163	20.56	3.33
（％）	(0.5)	(5.0)	(16.4)	(25.7)	(24.6)	(13.9)	(7.0)	(3.7)	(1.8)	(1.4)	(100.0)				
その他	58	334	863	1,351	1,433	970	548	287	135	112	6,091	1,466	7,557	20.92	3.58
（％）	(1.0)	(5.5)	(14.2)	(22.2)	(23.5)	(15.9)	(9.0)	(4.7)	(2.2)	(1.8)	(100.0)				
合計	1,586	9,190	30,223	53,857	59,920	46,421	27,966	14,929	7,716	6,611	258,419	51,689	310,108	21.51	3.66
（％）	(0.6)	(3.6)	(11.7)	(20.8)	(23.2)	(18.0)	(10.8)	(5.8)	(3.0)	(2.6)	(100.0)				
記載なし															
（％）															
総計	1,586	9,190	30,223	53,857	59,920	46,421	27,966	14,929	7,716	6,611	258,419	51,689	310,108	21.51	3.66
（％）	(0.6)	(3.6)	(11.7)	(20.8)	(23.2)	(18.0)	(10.8)	(5.8)	(3.0)	(2.6)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査