

表 2765 Body Mass Index 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前補正 カルシウム濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	10 (1.0)	38 (3.6)	128 (12.2)	190 (18.2)	245 (23.4)	170 (16.3)	122 (11.7)	65 (6.2)	45 (4.3)	32 (3.1)	1,045 (100.0)	97	1,142	21.67	3.87
7.0～ (%)	3 (0.2)	38 (2.6)	149 (10.2)	274 (18.7)	336 (23.0)	271 (18.5)	198 (13.5)	85 (5.8)	49 (3.3)	60 (4.1)	1,463 (100.0)	186	1,649	22.02	3.79
7.5～ (%)	31 (0.5)	143 (2.5)	601 (10.5)	1,130 (19.7)	1,299 (22.6)	1,083 (18.8)	684 (11.9)	362 (6.3)	199 (3.5)	216 (3.8)	5,748 (100.0)	651	6,399	21.91	3.78
8.0～ (%)	97 (0.5)	478 (2.6)	1,897 (10.2)	3,724 (20.1)	4,386 (23.7)	3,562 (19.2)	2,105 (11.4)	1,162 (6.3)	570 (3.1)	552 (3.0)	18,533 (100.0)	1,906	20,439	21.77	3.64
8.4～ (%)	26 (0.5)	166 (3.1)	581 (10.8)	1,152 (21.4)	1,283 (23.8)	978 (18.2)	561 (10.4)	347 (6.4)	181 (3.4)	112 (2.1)	5,387 (100.0)	485	5,872	21.59	3.58
8.5～ (%)	294 (0.5)	1,878 (3.0)	6,977 (11.3)	12,776 (20.7)	14,442 (23.4)	11,365 (18.4)	6,880 (11.1)	3,626 (5.9)	1,935 (3.1)	1,668 (2.7)	61,841 (100.0)	5,478	67,319	21.62	3.64
9.0～ (%)	400 (0.5)	2,563 (3.4)	8,631 (11.4)	15,676 (20.7)	17,796 (23.5)	13,664 (18.1)	8,257 (10.9)	4,460 (5.9)	2,250 (3.0)	1,902 (2.5)	75,599 (100.0)	6,405	82,004	21.54	3.63
9.5～ (%)	349 (0.7)	1,966 (3.9)	5,962 (11.9)	10,335 (20.7)	11,433 (22.9)	8,818 (17.7)	5,435 (10.9)	2,892 (5.8)	1,481 (3.0)	1,230 (2.5)	49,901 (100.0)	4,068	53,969	21.46	3.68
10.0～ (%)	58 (1.0)	252 (4.1)	766 (12.6)	1,349 (22.2)	1,386 (22.8)	1,031 (17.0)	628 (10.3)	327 (5.4)	136 (2.2)	142 (2.3)	6,075 (100.0)	523	6,598	21.24	3.63
10.1～ (%)	138 (0.9)	738 (4.7)	2,051 (13.2)	3,395 (21.8)	3,526 (22.7)	2,667 (17.1)	1,509 (9.7)	772 (5.0)	418 (2.7)	343 (2.2)	15,557 (100.0)	1,420	16,977	21.16	3.66
10.5～ (%)	70 (0.9)	411 (5.4)	1,082 (14.3)	1,718 (22.8)	1,602 (21.2)	1,222 (16.2)	698 (9.2)	374 (5.0)	210 (2.8)	161 (2.1)	7,548 (100.0)	722	8,270	21.02	3.71
11.0～ (%)	37 (1.5)	182 (7.2)	425 (16.8)	577 (22.9)	549 (21.7)	367 (14.5)	190 (7.5)	110 (4.4)	50 (2.0)	38 (1.5)	2,525 (100.0)	256	2,781	20.51	3.60
11.5～ (%)	15 (1.7)	65 (7.5)	132 (15.2)	191 (22.0)	200 (23.0)	135 (15.5)	67 (7.7)	28 (3.2)	22 (2.5)	14 (1.6)	869 (100.0)	104	973	20.54	3.65
12.0～ (%)	16 (2.7)	49 (8.2)	122 (20.4)	130 (21.8)	137 (22.9)	64 (10.7)	51 (8.5)	14 (2.3)	7 (1.2)	7 (1.2)	597 (100.0)	84	681	19.93	3.48
合計 (%)	1,544 (0.6)	8,967 (3.5)	29,504 (11.7)	52,617 (20.8)	58,620 (23.2)	45,397 (18.0)	27,385 (10.8)	14,624 (5.8)	7,553 (3.0)	6,477 (2.6)	252,688 (100.0)	22,385	275,073	21.51	3.66
記載なし (%)	42 (0.7)	223 (3.9)	719 (12.5)	1,240 (21.6)	1,300 (22.7)	1,024 (17.9)	581 (10.1)	305 (5.3)	163 (2.8)	134 (2.3)	5,731 (100.0)	29,304	35,035	21.34	3.64
総計 (%)	1,586 (0.6)	9,190 (3.6)	30,223 (11.7)	53,857 (20.8)	59,920 (23.2)	46,421 (18.0)	27,966 (10.8)	14,929 (5.8)	7,716 (3.0)	6,611 (2.6)	258,419 (100.0)	51,689	310,108	21.51	3.66
平均	9.38	9.34	9.25	9.21	9.18	9.16	9.15	9.15	9.14	9.11	9.19	9.17	9.19		
標準偏差	0.88	0.81	0.78	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.73	0.73	0.74	0.79	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査