

表 2776 Body Mass Index 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	424	3,061	12,585	26,267	32,639	26,345	15,648	8,124	4,038	3,270	132,401	14,632	147,033	21.81	3.50
(%)	(0.3)	(2.3)	(9.5)	(19.8)	(24.7)	(19.9)	(11.8)	(6.1)	(3.0)	(2.5)	(100.0)				
女性	887	4,545	11,895	16,889	15,041	10,465	6,265	3,564	1,953	1,894	73,398	8,540	81,938	20.83	3.85
(%)	(1.2)	(6.2)	(16.2)	(23.0)	(20.5)	(14.3)	(8.5)	(4.9)	(2.7)	(2.6)	(100.0)				
合計	1,311	7,606	24,480	43,156	47,680	36,810	21,913	11,688	5,991	5,164	205,799	23,172	228,971	21.46	3.66
(%)	(0.6)	(3.7)	(11.9)	(21.0)	(23.2)	(17.9)	(10.6)	(5.7)	(2.9)	(2.5)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	1,311	7,606	24,480	43,156	47,680	36,810	21,913	11,688	5,991	5,164	205,799	23,172	228,971	21.46	3.66
(%)	(0.6)	(3.7)	(11.9)	(21.0)	(23.2)	(17.9)	(10.6)	(5.7)	(2.9)	(2.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査