

表 2783 Body Mass Index 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回）

透析後体重	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	12 (100.0)										12 (100.0)	23	35	7.26	1.11
20～ (%)	358 (52.6)	262 (38.5)	52 (7.6)	4 (0.6)	3 (0.4)				1 (0.1)		680 (100.0)	82	762	13.92	1.72
30～ (%)	512 (3.4)	3,975 (26.5)	6,805 (45.4)	3,118 (20.8)	502 (3.4)	53 (0.4)	8 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.0)	4 (0.0)	14,981 (100.0)	1,418	16,399	16.91	1.70
40～ (%)	5 (0.0)	308 (1.0)	4,992 (15.8)	12,755 (40.5)	9,682 (30.7)	3,138 (10.0)	541 (1.7)	74 (0.2)	8 (0.0)	8 (0.0)	31,511 (100.0)	2,387	33,898	19.78	1.87
50～ (%)			46 (0.3)	1,007 (5.7)	4,738 (26.7)	6,617 (37.3)	3,879 (21.9)	1,199 (6.8)	216 (1.2)	46 (0.3)	17,748 (100.0)	1,234	18,982	23.03	2.08
60～ (%)				5 (0.1)	114 (1.9)	642 (10.5)	1,767 (28.8)	1,966 (32.1)	1,154 (18.8)	485 (7.9)	6,133 (100.0)	433	6,566	26.61	2.35
70～ (%)					2 (0.1)	15 (0.8)	70 (3.8)	312 (17.0)	530 (28.9)	907 (49.4)	1,836 (100.0)	201	2,037	29.90	2.34
80～ (%)								11 (2.5)	40 (9.2)	386 (88.3)	437 (100.0)	226	663	32.29	1.81
90～ (%)								1 (1.9)	1 (1.9)	52 (96.3)	54 (100.0)	167	221	33.13	1.49
100～ (%)										5 (100.0)	5 (100.0)	56	61	34.45	0.14
110～ (%)										1 (100.0)	1 (100.0)	25	26	34.75	
120～ (%)												11	11		
合計 (%)	887 (1.2)	4,545 (6.2)	11,895 (16.2)	16,889 (23.0)	15,041 (20.5)	10,465 (14.3)	6,265 (8.5)	3,564 (4.9)	1,953 (2.7)	1,894 (2.6)	73,398 (100.0)	6,263	79,661	20.83	3.85
記載なし (%)												2,277	2,277		
総計 (%)	887 (1.2)	4,545 (6.2)	11,895 (16.2)	16,889 (23.0)	15,041 (20.5)	10,465 (14.3)	6,265 (8.5)	3,564 (4.9)	1,953 (2.7)	1,894 (2.6)	73,398 (100.0)	8,540	81,938	20.83	3.85
平均	30.39	35.00	39.32	43.54	47.98	52.37	57.18	62.13	66.88	74.44	47.82	50.22	48.01		
標準偏差	3.55	3.28	3.69	4.07	4.53	4.93	5.41	5.98	6.38	8.29	9.98	16.16	10.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査