

表 2800 Body Mass Index 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	7 (0.9)	30 (3.7)	99 (12.3)	146 (18.2)	197 (24.6)	132 (16.5)	89 (11.1)	45 (5.6)	33 (4.1)	24 (3.0)	802 (100.0)	72	874	21.57	3.83
7.0～ (%)	3 (0.3)	28 (2.5)	124 (11.0)	218 (19.4)	251 (22.4)	203 (18.1)	148 (13.2)	68 (6.1)	34 (3.0)	46 (4.1)	1,123 (100.0)	143	1,266	21.94	3.79
7.5～ (%)	26 (0.6)	119 (2.6)	489 (10.9)	881 (19.6)	1,021 (22.7)	836 (18.6)	535 (11.9)	271 (6.0)	157 (3.5)	159 (3.5)	4,494 (100.0)	477	4,971	21.85	3.78
8.0～ (%)	77 (0.5)	396 (2.7)	1,545 (10.4)	3,003 (20.3)	3,518 (23.7)	2,830 (19.1)	1,649 (11.1)	919 (6.2)	443 (3.0)	443 (3.0)	14,823 (100.0)	1,467	16,290	21.74	3.64
8.4～ (%)	17 (0.4)	138 (3.2)	478 (11.1)	931 (21.6)	1,033 (23.9)	780 (18.1)	436 (10.1)	267 (6.2)	148 (3.4)	90 (2.1)	4,318 (100.0)	358	4,676	21.55	3.59
8.5～ (%)	246 (0.5)	1,569 (3.2)	5,684 (11.4)	10,322 (20.8)	11,597 (23.3)	9,163 (18.4)	5,437 (10.9)	2,892 (5.8)	1,499 (3.0)	1,312 (2.6)	49,721 (100.0)	4,181	53,902	21.58	3.63
9.0～ (%)	330 (0.5)	2,113 (3.5)	7,018 (11.6)	12,546 (20.8)	14,206 (23.5)	10,869 (18.0)	6,514 (10.8)	3,528 (5.8)	1,771 (2.9)	1,478 (2.4)	60,373 (100.0)	4,863	65,236	21.51	3.63
9.5～ (%)	303 (0.8)	1,606 (4.1)	4,772 (12.1)	8,216 (20.9)	8,997 (22.9)	6,895 (17.5)	4,234 (10.8)	2,221 (5.6)	1,107 (2.8)	963 (2.4)	39,314 (100.0)	3,090	42,404	21.40	3.68
10.0～ (%)	49 (1.0)	210 (4.3)	619 (12.8)	1,077 (22.3)	1,087 (22.5)	814 (16.8)	498 (10.3)	253 (5.2)	111 (2.3)	115 (2.4)	4,833 (100.0)	394	5,227	21.20	3.66
10.1～ (%)	117 (1.0)	620 (5.1)	1,631 (13.4)	2,695 (22.1)	2,765 (22.6)	2,057 (16.8)	1,156 (9.5)	587 (4.8)	321 (2.6)	261 (2.1)	12,210 (100.0)	1,067	13,277	21.09	3.66
10.5～ (%)	54 (0.9)	345 (5.9)	859 (14.6)	1,359 (23.1)	1,232 (20.9)	969 (16.5)	509 (8.6)	279 (4.7)	165 (2.8)	116 (2.0)	5,887 (100.0)	566	6,453	20.93	3.69
11.0～ (%)	25 (1.3)	154 (7.8)	341 (17.4)	460 (23.4)	430 (21.9)	270 (13.7)	133 (6.8)	87 (4.4)	39 (2.0)	26 (1.3)	1,965 (100.0)	200	2,165	20.39	3.57
11.5～ (%)	12 (1.7)	54 (7.8)	109 (15.8)	151 (21.9)	159 (23.1)	105 (15.3)	53 (7.7)	16 (2.3)	18 (2.6)	11 (1.6)	688 (100.0)	81	769	20.43	3.62
12.0～ (%)	11 (2.4)	44 (9.4)	95 (20.3)	107 (22.9)	102 (21.8)	46 (9.8)	39 (8.3)	11 (2.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	468 (100.0)	71	539	19.89	3.52
合計 (%)	1,277 (0.6)	7,426 (3.7)	23,863 (11.9)	42,112 (20.9)	46,595 (23.2)	35,969 (17.9)	21,430 (10.7)	11,444 (5.7)	5,853 (2.9)	5,050 (2.5)	201,019 (100.0)	17,030	218,049	21.47	3.66
記載なし (%)	34 (0.7)	180 (3.8)	617 (12.9)	1,044 (21.8)	1,085 (22.7)	841 (17.6)	483 (10.1)	244 (5.1)	138 (2.9)	114 (2.4)	4,780 (100.0)	6,142	10,922	21.31	3.65
総計 (%)	1,311 (0.6)	7,606 (3.7)	24,480 (11.9)	43,156 (21.0)	47,680 (23.2)	36,810 (17.9)	21,913 (10.6)	11,688 (5.7)	5,991 (2.9)	5,164 (2.5)	205,799 (100.0)	23,172	228,971	21.46	3.66
平均	9.38	9.35	9.24	9.21	9.17	9.16	9.15	9.14	9.14	9.11	9.19	9.17	9.18		
標準偏差	0.85	0.81	0.77	0.74	0.73	0.71	0.71	0.69	0.73	0.72	0.74	0.79	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査