

表 2811 Body Mass Index 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	43	362	1,847	4,375	5,622	4,676	2,909	1,568	815	673	22,890	2,304	25,194	22.11	3.51
(%)	(0.2)	(1.6)	(8.1)	(19.1)	(24.6)	(20.4)	(12.7)	(6.9)	(3.6)	(2.9)	(100.0)				
女性	106	684	2,151	3,239	2,840	1,895	1,179	629	362	344	13,429	1,323	14,752	20.91	3.75
(%)	(0.8)	(5.1)	(16.0)	(24.1)	(21.1)	(14.1)	(8.8)	(4.7)	(2.7)	(2.6)	(100.0)				
合計	149	1,046	3,998	7,614	8,462	6,571	4,088	2,197	1,177	1,017	36,319	3,627	39,946	21.67	3.65
(%)	(0.4)	(2.9)	(11.0)	(21.0)	(23.3)	(18.1)	(11.3)	(6.0)	(3.2)	(2.8)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	149	1,046	3,998	7,614	8,462	6,571	4,088	2,197	1,177	1,017	36,319	3,627	39,946	21.67	3.65
(%)	(0.4)	(2.9)	(11.0)	(21.0)	(23.3)	(18.1)	(11.3)	(6.0)	(3.2)	(2.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査