

表 2814 Body Mass Index 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	58	475	1,912	3,370	3,422	2,361	1,234	581	273	213	13,899	1,177	15,076	20.98	3.33
（％）	(0.4)	(3.4)	(13.8)	(24.2)	(24.6)	(17.0)	(8.9)	(4.2)	(2.0)	(1.5)	(100.0)				
慢性腎盂腎炎	5	18	55	112	99	56	25	16	3	8	397	25	422	20.57	3.31
（％）	(1.3)	(4.5)	(13.9)	(28.2)	(24.9)	(14.1)	(6.3)	(4.0)	(0.8)	(2.0)	(100.0)				
急速進行性糸球体腎炎	1	13	48	74	62	35	14	6	4	6	263	21	284	20.37	3.39
（％）	(0.4)	(4.9)	(18.3)	(28.1)	(23.6)	(13.3)	(5.3)	(2.3)	(1.5)	(2.3)	(100.0)				
妊娠腎/妊娠中毒症	2	14	60	102	70	37	20	13	8	8	334	25	359	20.52	3.66
（％）	(0.6)	(4.2)	(18.0)	(30.5)	(21.0)	(11.1)	(6.0)	(3.9)	(2.4)	(2.4)	(100.0)				
その他の分類不能の腎炎	2	12	19	50	44	21	18	11	4	1	182	13	195	20.84	3.49
（％）	(1.1)	(6.6)	(10.4)	(27.5)	(24.2)	(11.5)	(9.9)	(6.0)	(2.2)	(0.5)	(100.0)				
多発性嚢胞腎		26	121	279	382	303	129	59	15	19	1,333	131	1,464	21.45	2.95
（％）		(2.0)	(9.1)	(20.9)	(28.7)	(22.7)	(9.7)	(4.4)	(1.1)	(1.4)	(100.0)				
腎硬化症	14	76	271	539	632	496	310	170	77	47	2,632	254	2,886	21.62	3.53
（％）	(0.5)	(2.9)	(10.3)	(20.5)	(24.0)	(18.8)	(11.8)	(6.5)	(2.9)	(1.8)	(100.0)				
悪性高血圧		6	22	35	58	57	45	30	12	19	284	28	312	23.04	4.01
（％）		(2.1)	(7.7)	(12.3)	(20.4)	(20.1)	(15.8)	(10.6)	(4.2)	(6.7)	(100.0)				
糖尿病性腎症	25	198	800	1,868	2,493	2,343	1,817	1,054	643	575	11,816	1,357	13,173	22.81	3.83
（％）	(0.2)	(1.7)	(6.8)	(15.8)	(21.1)	(19.8)	(15.4)	(8.9)	(5.4)	(4.9)	(100.0)				
SLE腎炎	6	23	71	100	66	37	17	2	4	4	330	33	363	19.66	3.10
（％）	(1.8)	(7.0)	(21.5)	(30.3)	(20.0)	(11.2)	(5.2)	(0.6)	(1.2)	(1.2)	(100.0)				
アミロイド腎		3	13	16	14	4	4		1		55	4	59	19.75	2.94
（％）		(5.5)	(23.6)	(29.1)	(25.5)	(7.3)	(7.3)		(1.8)		(100.0)				
痛風腎	1	2	14	24	38	25	21	7	4	2	138	16	154	21.70	3.32
（％）	(0.7)	(1.4)	(10.1)	(17.4)	(27.5)	(18.1)	(15.2)	(5.1)	(2.9)	(1.4)	(100.0)				
先天性代謝異常による腎不全		1	8	10	9	8			1	4	41	3	44	21.16	4.54
（％）		(2.4)	(19.5)	(24.4)	(22.0)	(19.5)			(2.4)	(9.8)	(100.0)				
腎・尿路結核		4		7	6	1	1	1	1	1	22		22	20.83	4.47
（％）		(18.2)		(31.8)	(27.3)	(4.5)	(4.5)	(4.5)	(4.5)	(4.5)	(100.0)				
腎・尿路結石	1	6	4	16	16	6	6	4	1	1	61	8	69	20.95	3.73
（％）	(1.6)	(9.8)	(6.6)	(26.2)	(26.2)	(9.8)	(9.8)	(6.6)	(1.6)	(1.6)	(100.0)				
腎・尿路腫瘍	1	4	7	22	16	14	7	4	3	2	80	5	85	21.29	3.76
（％）	(1.3)	(5.0)	(8.8)	(27.5)	(20.0)	(17.5)	(8.8)	(5.0)	(3.8)	(2.5)	(100.0)				
閉塞性尿路障害	1	1	11	20	15	5	6	4	2		65	9	74	20.69	3.36
（％）	(1.5)	(1.5)	(16.9)	(30.8)	(23.1)	(7.7)	(9.2)	(6.2)	(3.1)		(100.0)				
骨髄腫			4	5	6	3					18	1	19	19.99	1.95
（％）			(22.2)	(27.8)	(33.3)	(16.7)					(100.0)				
腎形成不全	1	6	10	22	24	19	7	3		4	96	5	101	21.06	3.91
（％）	(1.0)	(6.3)	(10.4)	(22.9)	(25.0)	(19.8)	(7.3)	(3.1)		(4.2)	(100.0)				
不明	21	111	386	665	711	528	310	176	90	77	3,075	405	3,480	21.40	3.65
（％）	(0.7)	(3.6)	(12.6)	(21.6)	(23.1)	(17.2)	(10.1)	(5.7)	(2.9)	(2.5)	(100.0)				
再導入	2	13	64	106	94	59	25	14	8	5	390	26	416	20.64	3.22
（％）	(0.5)	(3.3)	(16.4)	(27.2)	(24.1)	(15.1)	(6.4)	(3.6)	(2.1)	(1.3)	(100.0)				
その他	8	34	98	172	185	153	72	42	23	21	808	81	889	21.31	3.64
（％）	(1.0)	(4.2)	(12.1)	(21.3)	(22.9)	(18.9)	(8.9)	(5.2)	(2.8)	(2.6)	(100.0)				
合計	149	1,046	3,998	7,614	8,462	6,571	4,088	2,197	1,177	1,017	36,319	3,627	39,946	21.67	3.65
（％）	(0.4)	(2.9)	(11.0)	(21.0)	(23.3)	(18.1)	(11.3)	(6.0)	(3.2)	(2.8)	(100.0)				
記載なし（％）															
総計（％）	149	1,046	3,998	7,614	8,462	6,571	4,088	2,197	1,177	1,017	36,319	3,627	39,946	21.67	3.65
（％）	(0.4)	(2.9)	(11.0)	(21.0)	(23.3)	(18.1)	(11.3)	(6.0)	(3.2)	(2.8)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査